


Kajpak, če poleg prebivališča ustreza tudi datum. Vprašljivost presoje pa se sunkovito poveča, če je jata mešana, medtem ko za spolno nezrele primerke ne more biti v zvezi z gnezdenjem nikakršnega dvoma, ker je odgovor lahko le enoglasni ne.

In kako se rečni galeb *Larus ridibundus* starostno razlikuje. Kdor se zanaša na temno rjavo glavo (bolje kapuco), ki je videti od daleč črna, mora vedeti, da so možne pri spolno nezrelem primerku vse štiri variante obarvanosti glave: črna, črna z belimi lisami, bolj bela kot črna in povsem bela. Govorimo o poletnem perju, v katerem se sicer dobro ločita tudi po obarvanosti oziroma obrabljenosti zgornje peruti, najzanesljiveje pa po črni obrobi na koncu repa, ki pri odraslem rečnem galebu izgine. Primerek, ki ga je Trilar našel 7.8., je bil odrasli galeb z zimsko obarvano glavo, zakaj golitev in prenova perja na glavi se prične takoj po gnezdenju v juniju.

Za sedaj so vrisana v karto razširjenosti vsa, tudi vprašljiva opažanja. Malo verjetno je, da bodo opažanja, zdaj označeno z najmanjšo piko (koda B1), zdržala presojo, kot sem jo napovedal v tem komentarju. Prav bi bilo, da bi vsi, ki smo poročali o rečnih galebih, sporočili podrobnejša pojasnila. Vsekakor pa naj bi ta opozorila upoštevali v bodoče.

Iztok Geister

Naklo 246, 64202 Naklo



Iz ornitološke beležnice From the ornithological note-book

POLARNI SLAPNIK *Gavia arctica*

Dne 14.11.1983 sem v Markovcih pri zapornicah Ptujškega akumulacijskega jezera imel priložnost opazovati polarnega slapnika *Gavia arctica*. Primerek je bil v zimskem perju, dobro so bili vidni belo grlo in sivo teme ter tilnik.

NAVADNA GAGA *Somateria mollissima*

Dne 19.11.1983 sem na začetku Ptujškega jezera opazoval odraslega samca navadne gage *Somateria mollissima*. Racman je imel dolgo glavo s črnim temenom, ki ga je v zatilnem delu razpravljala bela lisa, tilnik pa je imel zeleno poprhan. Racman se je ves čas mojega opazovanja potapljal za hrano.

Franc Janžekovič

Bukovci 27, 62281 Markovci

ŽERJAV *Grus grus*

V dopoldanskih urah jeseni 1978. leta je vsakdanje življenje v Cirkulanah zmotil navadno glasen, če že ne kričel prihod dveh ogromnih klinov žerjavov, ki so v nenehnem oglašanju nadaljevali pot iz SV smeri proti JZ. Ko pa je kričanje kar nekako zasičilo ozračje, je poleg samih žerjavov bilo nadvse zanimivo opazovati vaščane in mimoidoče, kako so v dopoldanskem soncu z rokami na čelu začudeno zrli za njimi. V obeh klinih je bilo, po moji oceni nad 300, če ne okrog 400 žerjavov.

Borut Štumberger

Cirkulane 41, 62282 Cirkulane

POLOJNIK *Himantopus himantopus*

Od 20.4.1983 do 24.4. sem skupaj s T. Makovcem, B. Mozetičem, I. Škornikom in M. Miklavcem opazoval v Škocjanskem zatonu skupino polojnikov, ki so skupaj z mnogimi močvirskimi, zelenonogimi in malimi martinci, togotniki, malimi prodniki in čmorepimi kljunači brodili po plitvini. Samci in samice so se