

Trn



Kristus je šel po gozdu. Drevje in grmovje je nategovalo vratove, da ga vidi. Vse se je obleklo v najlepšo obleko in si nadelo najlepše cvetje. Saj je bilo spomladi.

Tudi trn je hotel videti Gospoda. Drevje in grmovje pa je kričalo nanj: »Skrij se, skrij se! Tebe Gospod sovraži, saj so mu tvoji trni nekoč ranili presveto glavo in mu trgali kožo s čela!« — To pa je slišal Gospod. Varno je razprostrl roke nad zaničevanim trnom in se obrnil k drugim: »Prenehajte, kajti jaz ljubim trnje, ker ono mi pripelje nazaj mnogo ovčic, ki jih vaša lepota in vaše cvetje izvablja na kriva pota.«



Nas dom

Leopold Paljk

Ko pomlad cvetoča pride ...

Pomlad je prišla v deželo in njen topli dih je zavel po gajih in livadah. Pa tudi nas, mlade sadjarje, je našla pripravljene. Staro drevje smo osnažili, pregošte veje zredčili, drevje poškopili, slabe sadne vrste precepili, a mlado drevje posadili. Okrog debel smo zemljo plitvo prekopali, uredili kolobar ter ga pokrili s predelanim hlevskim gnojem ali kompostom. Da nam bo drevo bujno rastle, skrbimo, da se drevesni kolobar tudi med letom ne zaraste s travnato rušo in plevelom.

Ako nastopi suša, je treba posajena mlada drevesca večkrat temeljito zaliti. To velja še posebno za špalirno drevje ob južni steni, kjer se zemlja najhitreje izsuši. Ker se je v jeseni posajeno drevesce do zdaj že dovolj v zemlji posedlo, ga že lahko trdno privežemo h kolu. Drevesca pa, ki smo jih posadili letošnjo pomlad, bomo trdno privezali h kolu šele pozneje. Ako se nam ni obneslo cep-

ljenje v razkol ali žleb v februarju in marcu, lahko drevo ponovno cepimo v aprilu in še celo v maju za kožo. V ta namen prikrajšamo vejo za nekoliko centimetrov in vstavimo cepič, kot je bilo povedano v zadnji številki »Vrtca«. Da veter ali ptiči ne odlomijo cepiča, pritrdite nad cepičem loka iz vrbove ali leskove šibe.

Vrtnaričice imajo polne roke dela


Na zavetno in sončno leho posejete navadno in rdeče zelje, ohrovt, kolerabe, rožnati kapus, solato in drugo povrtnino, kolikor je še niste. Tudi skrbite, da se v sejalnici ne razraste plevel. Zato mlade sejančke večkrat oplevite! V aprilu lahko še vedno sejemo na prosto solato, radič, grah in redkvico. Proti koncu mesca tudi že lahko posejemo nizki ali pritlični fižol. Tedaj tudi že lahko presajamo na prosto glavnatu solato, kolerabe in rano zelje, ki smo ga v marcu posejali v toplo gredo.

Ko je prvi grah priklil iz zemlje, ga je treba prisuti in obtakniti z natičjem. Mlade setve moramo takoj opleti. Ako smo seme sejali v vrste, nas plevel ne zamudi dosti. Plevel, t. j. rahljanje zemlje in zatiranje plevela, je namreč najvažnejše vrtnarsko opravilo. Pridne vrtnaričice ne trpe plevela na vrtu, ker dobro vedo, da je plevel najhujši sovražnik v vrtnarstvu, ker odjeda drugim rastlinam hrano in vlago, jih zasenčuje in zatira, da se ne morejo razviti. Nikoli ne čakajte, da se vam plevel razraste, razcvete in obrodi seme, ker se vam potem zaseje po vsem vrtu! S pletvijo pa zemljo tudi rahljate, da moreta zrak in toplota do korenin. Zlasti po dežju je treba gredice ponovno z motiko zrahljati.

Ko boste presajale zelenjad, upoštevajte sledeča navodila: Najprej pripravite gredico. Vse večje grude zdrobite ter površje zemlje poravnajte z grabljami. Najbolje je presajati ob vlažnem in oblačnem vremenu. Ako je po močnem dežju zemlja blatna, počakajte, da se prej nekoliko osuši. V suši pa zemljo čez dan poškopimo in nato šele proti večeru presajamo. Sadike presajamo z lesenim klinom. Ob



Obtikanje graha



Sajenje s klinom

napeti vrvice naredimo v zemljo primerno luknjo, nakar spustimo vanjo sadiko, nekoliko globokeje kot je rasla prej, t. j. do obeh kaličnih listkov, ter pritisnemo zemljo h koreninam s klinom, ki ga zabodemo tik luknje v zemljo. Pri tem pazimo, da se srčna korenina v zemlji ne zavihne, ker bi v takšnem primeru rastlina slabo uspevala. Zato je najbolje, da zelo dolge srčne korenine prej nekoliko odščipnemo. Na eno gredo posadimo rastline v 3, 4 in celo več vrstah. To je seveda odvisno od vrste zelenjadi. Grah sadimo na 1,20 m široko gredo v dveh vrstah 60—80 cm narazen, fižol grmičar v vrstah 30—40 cm druga od druge, preklar 60 cm, špinačo, peteršilj, redkvico, čebulo in por 20 cm, kolerabe in glavnatu solato 30 cm, rano in rdeče zelje, zeleno, endivijo 40 cm, pozno zelje in ohrovt 60 cm. Po presajanju sadike skrbno zalijemo.

Večkrat nam zgodnje setve ogrožajo ptiči, zlasti vrabci. Najlaže jih prepodimo na ta način, da napnemo nad gredicami bele bombažaste niti ter nastavimo »strasila«, t. j. zatakemo v koruzni storž ptičja peresa ter obesimo na niti, da se v vetru vrte ter odganjajo sitne vrabce. Še uspešneje se jih ubranimo, ako obesimo na nit ali vrstico svetle pločevinaste škatle, ki udarjajo v vetru druga od drugo.

V sejalnici se zlasti ob suhih letih kaj radi pojavijo na kapusnicah, repi in redkvici tako imenovani bolhači, ki žrejo mlade liste in nam večkrat pokončajo vso setev. Proti tej nadlogi se najuspešneje ubranimo, ako potresemo gredico s pepelom, apnenim prahom ali s sajami. Preženemo jih tudi na ta način, da gredico večkrat poškopimo, ker bolhači ne trpe vlage.