

Vprašanja ornitološkega atlasa:
Puzzles of the ornithological atlas:
Larus ridibundus

POJASNILO

3.4.1982 sem na Sorškem polju (kvadrant 12/44) na posestvu kmetijske zadruge med opazovanjem prib opazil tri rečne galebe, enega odraslega in dva spolno nezrela primerka, ki so se prehranjevali na sveže zorani njivi. Čeprav so njivo še orali, to odraslega galeba sploh ni motilo, mlajša sovrstnika pa sta se nemirno spreletavala, dokler niso vseh treh pregnale pribe.

7.4.1982 sta se na isti njivi skupaj s togotnikom prehranjevala dva rečna galeba, eden s temno in drugi s svetlo glavo.

8.4.1982 so z njive, ko sem se ji približal, odleteli trije spolno nezreli primerki in en odrasel rečni galeb.

12.5.1982 se je na tem področju spreletavala jata osmih rečnih galebov. Ko so se poskušali spustiti na tla, so jih pribe, ki so na tej njivi gnezdile, začele preganjati. Razkropljena jata se je zbrala in odletela proti Savi. V tem času se je na njivi zadrževal togotnik, vendar ga pribe niso preganjale.

8.7.1982 sem na cesti pri tovarni Iskra na Laborah našel povoženega rečnega galeba. Glave ni imel sajasto rjave, kot je značilno za odraslo ptico, in na repu ni imel značilnega črnega pasu, kot je značilno za mladiča.


Tomi Trilar

Pot v Bitnje 12, 64000 Kranj



KOMENTAR K POJASNILU

V Sloveniji so znane samo štiri gnezdilne kolonije rečnega galeba. Vsa ostala opazanja se zelo verjetno nanašajo na spolno nezrele osebkke, ki se v obdobju gnezdenja, v večjih ali manjših jatah, klatijo po našem ozemlju. Zato se zdi tedaj, ko jih opazujemo ob stoječi ali zastajajoči vodi, koda B1 "vrsta je opazovana v gnezditvenem obdobju in možnem gnezditvenem prebivališču", še kar primerna. Tega pa ne moremo trditi za opazovanja ob hitro tekoči vodi, na poljih ali celo v sredogorju. Tako sem naletel 1.6. na rečne galebe (5 ex.) pri vasi Otok ob zgornjem toku Savinje (pred Mozirjem) in 23.6. (ca. 60 ex.) pri Sodražici nad Logatcem. V takih primerih lahko zabeležimo le kodo A O "vrsta je opazovana v gnezditvenem obdobju". Ker pa je ugotavljanje tega, kaj je za galeba primerno prebivališče in kaj ne, s človeškimi očmi včasih prezahtevna naloga, je zanesljiveje odločiti se po stanju spolne zrelosti opazovanih primerkov. Če gre za čisto jato odraslih, to je spolno zrelih primerkov, lahko mirno zapišemo kodo C6 "opaženo je zadrževanje v domnevem gnezditvenem okolišu".



*Slika 1: Gnezditvena razširjenost rečnega galeba *Larus ridibundus* v Sloveniji (vir: OAS)*

*Figure 1: The breeding distribution of Black-headed Gull *Larus ridibundus* in Slovenia*