



**A CHECKLIST OF TURKISH NEUROPTERAN SPECIES (INSECTA:  
NEUROPTERA) WITH REMARKS ON PROVINCIAL DISTRIBUTION  
IN TURKEY**

Ismail ARI

Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences,  
Kilis 7 Aralık University, 7900 Kilis/Turkey  
ismailari@kilis.edu.tr

**Abstract** - A checklist of Turkish neuropteran species is given with annotations on provincial distribution in Turkey. The list is prepared on the basis of records in relevant articles. The order Neuroptera is represented by 203 species and 4 subspecies in Turkey.

**KEY WORDS:** Checklist, Neuroptera, Turkey

**Izveček – SEZNAM TURŠKIH MREŽEKRILCEV (INSECTA: NEUROPTERA)  
Z OPOMBAMI O POKRAJINSKI RAZŠIRJENOSTI V TURČIJI**

Seznam turških vrst mrežekrilcev je podan z opombami o razširjenosti po pokrajinah v Turčiji. Seznam je pripravljen na osnovi podatkov v ustreznih člankih. Red Neuroptera je v Turčiji zastopan z 203 vrstami in 4 podvrstami.

**KLJUČNE BESEDE:** Seznam vrst, Neuroptera, Turčija

**Introduction**

Lacewings belong to one of the most important groups of insects because of their significant role in integrated pest management as predators of aphids, mites, and several other agricultural pests (Ghahari et al., 2010). However, their distribution and biology are still poorly known.

Several scientists studied the Turkish neuropteran fauna during the 19th and early 20th centuries. As a result of their expeditions, large numbers of Turkish specimens are preserved in several of larger European collections. Turkish researchers started to study neuropteran fauna after 1980s, and began to make important contributions to

the knowledge of this fauna (Aspöck et al, 1965a; 1965b; 1967; 1969; 1978; Hölzel, 1967a; 1967b; 1972a; 1972b; 1978; Şengonca, 1979; 1980a; 1980b; 1981a; 1981b; Canbulat & Kıyak, 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2005a; 2005b; Canbulat, 2007a; 2007b; 2007c; Dobosz, 2007a; 2007b; Canbulat & Oğuz, 2013a; 2013b; Koçak & Kemal, 2008a; 2008b; Kovancı & Kovancı, 2007).

The last major revisional work on the neuropteran fauna of Turkey (Canbulat, 2007b) contains 193 species and 6 subspecies. Since then, S. Canbulat, A. Satar and A. Koçak have contributed several new records to the Turkish fauna. The continuation of current study will result in further increases in the number of known species and in a deeper understanding of their habitats and distributions in the future.

203 species and 4 subspecies in 65 genera and 11 families are listed for Turkey in the present study. The numbers by families are as follows: Ascalaphidae 14, Berothidae 2, Chrysopidae 52, Coniopterygidae 27, Dilaridae 2, Hemerobiidae 31, Mantispidae 4, Myrmeleontidae 56, Nemopteridae 13, Osmylidae 4, and Sisyridae 1.

## List of species

### Order: Neuroptera

#### Family: Ascalaphidae Lefébvre, 1842

##### 1. *Bubopsis andromache* U. Aspöck, H. Aspöck & H. Hölzel, [1979]

Antalya, Bursa and Mersin (Aspöck et al., 1978), Çanakkale (Letardi, 1991), Eskişehir, Hatay, Burdur (Kačirek, 1998), İzmir (Popov, 2004), Adana (Arı & Kıyak, 2000; Popov, 2004), Isparta and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

##### 2. *Bubopsis hamatus* (Klug, 1834)

Adana, İzmir, Mersin, and Şanlıurfa (Şengonca, 1979), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Diyarbakır, Mardin and Siirt (Satar & Özbay, 2004), Van (Canbulat, 2007b).

##### 3. *Bubopsis zarudnyi* Alexandrova – Martynova, 1926

Diyarbakır (Satar & Özbay, 2002).

##### 4. *Deleproctophylla australis* (Fabricius, 1787)

Edirne (Popov, 1977).

##### 5. *Deleproctophylla dusmeti* Navás, 1914

Iğdır and Kars (Arı et al., 2008), Denizli, Isparta, and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

##### 6. *Deleproctophylla variegata* (Klug, 1834)

Ardahan, Kars (Arı et al., 2008), Antalya, Burdur, Denizli, and Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b).

##### 7. *Iranoidricerus iranensis* (Kimmins, 1938)

Van (Kemal & Koçak, 2006; Canbulat, 2007b).

**8. *Libelloides jungei* Aistleitner, 1982**

Antalya (Aistleitner, 1982; Canbulat, 2007b; Sziráki, 1998).

**9. *Libelloides lacteus* (Brullé, 1832)**

Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Nevşehir (Kačirek, 1998), Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Antalya (Popov, 2004).

**10. *Libelloides macaronius* (Scopoli, 1763)**

Kayseri, Niğde (Kačirek, 1998), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Antalya, Burdur, Isparta, (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Ardahan (Arı et al., 2008).

**11. *Libelloides syriacus* (McLachlan, 1871)**

Hakkari (Şengonca, 1979), Hatay (Sziráki, 1988; Canbulat, 2007).

**12. *Libelloides rhomboideus rhomboideus* (Schneider, 1845)**

Ankara and Hatay (Kačirek, 1998), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**13. *Libelloides ustulatus* (Eversmann, 1850)**

Samsun, and Trabzon (Canbulat, 2007b)

**14. *Ptyngidricerus albardanus albardanus* (McLachlan, 1891)**

Mardin (McLachlan, 1891), Bitlis, Malatya, and Van (Canbulat, 2007b)

**Family: Berothidae Handlirsch, 1908**

**15. *Isoscelipteron fulvum* Costa, 1863**

Bursa (Brauer, 1864; Aspöck & Aspöck, 1980), Konya (Esben – Petersen, 1933), Kahramanmaraş (Şengonca, 1978), Antalya (Monserrat & Hölzel, 1987), Bursa, Elazığ, İzmir, Mersin (Aspöck, 1987), Burdur, and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**16. *Nyrma kervillea* Navás, 1933**

İzmir (Navás, 1933), Muş (Aspöck & Aspöck, 1979), and Şanlıurfa (Aspöck, 1989).

**Family: Chrysopidae Schneider, 1851**

**17. *Brinckochrysa amseli* (Hölzel, 1967)**

Adana (Şengonca, 1981a), Kahramanmaraş (Arı & Kıyak, 2000), Iğdır (Arı et al., 2007a).

**18. *Brinckochrysa chlorosoma* (Navás, 1914)**

Southeast Anatolia (Aspöck et al., 2001).

**19. *Chrysopidia ciliata* (Wesmael, 1841)**

Kahramanmaraş (Şengonca, 1981a), Iğdır (Arı et al., 2007a).

**20. *Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834**

Muğla (Schneider, 1845), Kars (Arı et al., 2007a).

**21. *Chrysopa astarte* Hölzel, 1967**

Anadolu (Şengonca, 1981a), Kars (Arı et al., 2007a)

**22. *Chrysopa curdica* Hölzel, 1967**

Van (Hölzel, 1967b; Şengonca, 1981a), Kars (Arı et al., 2007a)

**23. *Chrysopa dorsalis* Burmeister, 1839**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Mersin (Hölzel, 1967a; Şengonca, 1981a), Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Antalya, Burdur, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005), Ardahan, Kars (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b)

**24. *Chrysopa dubitans* McLachlan, 1887**

Mersin (Hölzel, 1965; 1967), Adana (Popov, 1977), Antalya, Denizli, Hatay, İzmir, Mardin, Siirt (Şengonca, 1980a, 1981a), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Mardin (Satar & Özbay, 2004; Özgen et al., 2012), Ardahan, and Kars (Arı et al., 2007a).

**25. *Chrysopa formosa* Brauer, 1851**

Kayseri (Hölzel, 1967; Canbulat & Kıyak, 2002b), Middle and South Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Amasya, Ankara, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri (Şengonca, 1981a), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Antalya, Burdur, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ardahan, Kars (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b)

**26. *Chrysopa fuscostigma* Esben – Petersen, 1933**

Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1996; Aspöck et al., 2001).

**27. *Chrysopa hungarica* Klapálek, 1899**

Middle and South Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Yozgat (Aspöck et al., 1980), Tokat, Konya (Hölzel, 1967a), Afyon, Ankara, Bursa, Denizli, Mersin (Şengonca, 1981a), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007).

**28. *Chrysopa nigrescens* Hölzel & Ohm, 1986**

Mersin (Hölzel & Ohm, 1986), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**29. *Chrysopa nigricostata* Brauer, 1851**

East Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969; Şengonca, 1981a), Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**30. *Chrysopa pallens* (Rambur, 1838)**

Nevşehir (Tuatay et al., 1972), Ankara (Popov, 1977), İazmir (Şengonca, 1979), Adana, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin (Şengonca, 1981a), Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Burdur, Denizli, Isparta, Muğla, (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ardahan, Kars (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**31. *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758)**

Kayseri (Hölzel, 1967a), Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Ankara (Şengonca, 1981a), dirne (Onar & Aktaç, 2002), Ardahan (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum Canbulat & Oğuz, 2013b).

**32. *Chrysopa phyllochroma* Wesmael, 1841**

Konya (Esben – Petersen, 1933).

**33. *Chrysopa viridana* Schneider, 1845**

Kahramanmaraş (Hölzel, 1967a; Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), East Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Antalya (Gepp, 1974), Ankara, Denizli, Mersin (Şengonca, 1981a), Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**34. *Chrysopa walkeri* McLachlan, 1893**

East Anatolia (Şengonca, 1981a), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Ardahan (Arı et al., 007a).

**35. *Chrysopa wagneri* Esben – Petersen, 1932**

Konya (Esben – Petersen, 1933).

**36. *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836)**

Ankara (Navás, 1926), Konya (Esben – Petersen, 1933), Nevşehir, Niğde (Tuatay et al., 1972), Antalya, Van (Gepp, 1974), Adana (Popov, 1977; Arı & Kıyak, 2000), Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Van (Şengonca, 1980; Canbulat & Kıyak, 2005b), Konya (Monserrat & Hölzel, 1987), Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000), Kayseri (Canbulat, 2002) Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Batman, Diyarbakır, Mardin, (Satar & Özbay, 2004), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Ardahan, Iğdır, Kars (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**37. *Chrysoperla lucasina* (Lacroix, 1912)**

Konya (Esben – Petersen, 1933).

**38. *Chrysoperla mutata* (McLachlan, 1898)**

Anatolia (Aspöck et al., 1980, 2001; Canard & Laudeho, 1977).

**39. *Chrysoperla rotundata* (Navás, 1929)**

İzmir (Şengonca, 1981a).

**40. *Chrysotropia ciliata* (Navás, 1911)**

North Anatolia (Aspöck et al., 2001) and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**41. *Cunctochrysa albolineata* (Killington, 1935)**

Elaziğ (Hölzel, 1967a), Middle and South Anatolia (Aspök & Aspöck, 1969), Ankara (Şengonca, 1981), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Ardahan (Arı et al., 2007a).

**42. *Cunctochrysa baetica* (Hölzel, 1972)**

Tokat, Ankara (Hölzel, 1972; Şengonca, 1981a), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**43. *Hypochrysa elegans* (Burmeister, 1839)**

Middle and South Anatolia (Aspöck & Aspöck 1969a; Şengonca, 1981a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Antalya, and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**44. *Italo-chrysa italica* (Rossi, 1790)**

Konya (Hölzel, 1967a), East Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), İzmir, Mersin (Şengonca, 1981a), Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000); Kahramanmaraş (Arı & Kıyak, 2000), Adıyaman (Satar & Özbay, 2004), Isparta, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Iğdır, (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**45. *Italo-chrysa vartianorum* Hölzel, 1967**

Kahramanmaraş (Hölzel, 1967) and Mersin (Şengonca, 1980).

**46. *Nineta carinthiaca* (Hölzel, 1965)**

Northeast Anatolia (Şengonca, 1980), Mersin (Şengonca 1981a), Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Arhadan (Arı et al., 2007a).

**47. *Nineta flava* (Scopoli, 1763)**

East Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Van (Gepp, 1974; Şengonca, 1980a), Adana (Şengonca, 1981a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**48. *Nineta gevnensis* Canbulat & Kıyak, 2003**

Konya (Canbulat & Kıyak, 2003b).

**49. *Nineta pallida* (Schneider, 1846)**

Isparta (Canbulat & Kıyak, 2002b; 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Arhadan (Arı et al., 2007a).

**50. *Nineta principiae* Monserrat, 1980**

Samsun (Aspöck et al., 1980), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**51. *Nothochrysa fulviceps* (Stephens, 1836)**

Isparta (Canbulat & Kıyak, 2004) and Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007).

**52. *Nothochrysa turcica* (Kovancı & Canbulat, 2007)**

Bursa (Kovancı & Canbulat, 2007a).

**53. *Peyrimhoffina gracilis* (Schneider, 1851)**

Artvin, Bursa (Aspöck et al. 1980), Antalya, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Arhadan (Arı et al., 2007), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**54. *Pseudomallada clathratus* (Schneider, 1845)**

Elazığ (Hölzel, 1967a), İzmir, Mersin (Şengonca, 1981a), Edirne (Onar & Aktaş, 2002), Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**55. *Pseudomallada flavifrons* (Brauer, 1850)**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969), Ankara, Mardin, Ankara (Şengonca, 1981a), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Edirne (Onar & Aktaş, 2002), Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak (Satar & Özbay, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Mardin (Özgen et al., 2012), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**56. *Pseudomallada genei* (Rambur, 1842)**

Çanakkale, İzmir, Mersin (Şengonca, 1980, 1981a), Antalya, and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005).

**57. *Pseudomallada hadimensis* Canbulat & Kıyak, 2005**

Konya (Canbulat & Kıyak, 2005a).

**58. *Pseudomallada inornatus* (Navás, 1901)**

Edirne (Onar & Aktaş, 2002) and Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007).

**59. *Pseudomallada prasinus* (Burmeister, 1839)**

Edirne (Gepp 1974; Onar & Aktaç, 2002), Ankara (Popov, 1977), Edirne, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Samsun, Adana (Şengonca, 1980a, 1981a), Aydın, Konya (Monserrat & Hölzel 1987), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000), Kahramanmaraş (Bahadıroğlu & Daymaz, 2001), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b); Kırşehir (Canbulat & Özseraç, 2004); Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt (Satar & Özbay, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars, Arhadan, Iğdır (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**60. *Pseudomallada subflavifrons* (Tjeder, 1949)**

Gülden in Anatolia (Hölzel, 1967a), Edirne (Gepp, 1974), Adana, Antakya, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Samsun (Şengonca, 1981a), Kars, and Arhadan (Arı et al., 2007a).

**61. *Pseudomallada sybariticus* (McLachlan, 1875)**

Van (Gepp 1974; Şengonca, 1981a).

**62. *Pseudomallada venosus* (Rambur, 1838)**

Mardin (Hölzel, 1967a; Şengonca, 1981a), Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004), and Iğdır (Arı et al., 2007).

**63. *Pseudomallada ventralis* (Curtis, 1834)**

Arhadan (Arı et al., 2007a)

**64. *Pseudomallada zelleri* (Schneider, 1851)**

Mersin (Hölzel, 1967a), Aydın, Ankara, Mersin, Isparta (Şengonca, 1981a), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2000), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Edirne (Onar & Aktaç, 2002), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars, Arhadan (Arı et al., 2007a), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**65. *Rexa raddai* (Hölzel, 1966)**

Bilecik (Hölzel, 1966; Şengonca, 1981a), Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Bursa (Kovancı & Kovancı, 2007), and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**66. *Suarius caviceps* (McLachlan, 1898)**

Konya (Esben-Petersen, 1933).

**67. *Suarius nanus* (McLachlan, 1893)**

Adana (McLachlan, 1893), Konya (Hölzel, 1965), Mardin (Hölzel 1967a), Mersin, Mardin, Konya, Ankara, Denizli, Malatya, Elazığ, Isparta, İzmir (Hölzel 1978; Şen-



gonca, 1981a), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Kars (Ari et al., 2007).

**68. *Suarius vanensis* (Hölzel, 1967)**

Van (Hölzel, 1967b; Şengonca, 1981a).

**69. *Suarius vartianae* (Hölzel, 1967)**

East Anatolia (Aspöck et al., 2001).

**Family: Coniopterygidae Burmeister, 1839**

**70. *Aleuropteryx loewi* Klapálek, 1894**

Anatolia (Aspöck et al., 1980, 2001) and Burdur (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**71. *Aleuropteryx umbrata* Zelený, 1964**

Mersin (Aspöck & Aspöck, 1965a; 1965b; Meinander, 1972), Antalya (Monserrat & Hölzel, 1987), Isparta, Denizli, Aydın (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**72. *Coniopteryx (Coniopteryx) borealis* Tjeder, 1931**

Sinop (Canbulat, 2013a).

**73. *Coniopteryx (Coniopteryx) pygmaea* Enderlein, 1906**

Anatolia (Aspöck et al., 2001), Mersin (Meinander, 1972), Antalya (Monserrat & Hölzel, 1987), Isparta, Denizli, Aydın (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**74. *Coniopteryx (Coniopteryx) tineiformis* Curtis, [1834]**

North Anatolia (Aspöck, 1969a).

**75. *Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti* Rousset, 1964**

Anatolia (Aspöck et al., 1980, 2001; Popov, 1986b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**76. *Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica* McLachlan, 1868**

North Anatolia (Aspöck et al., 1980; Aspöck & Hölzel, 1996; Popov, 1986b), and Amasya (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**77. *Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata* Kis, 1965**

East and Middle Black Sea region (Monserrat, 1979), Bolu, Ankara, Tokat (Aspöck & Aspöck, 1969a), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**78. *Coniopteryx (Metaconiopteryx) esbenpeterseni* Tjeder, 1930**

Middle and Northeast Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**79. *Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae* H. Aspöck & U. Aspöck, 1964**

South Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**80. *Coniopteryx (Metaconiopteryx) tjederi* Kimmins, 1934**

Mersin (Aspöck & Aspöck, 1965a, 1965b), South Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a).

**81. *Coniopteryx (Xeroconiopteryx) atlasensis* Meinander, 1963**

Mersin and Van (Gepp, 1974).

**82. *Coniopteryx (Coniopteryx) loipetsederi* H. Aspöck, 1963**

Düzce (Canbulat, 2013a).

**83. *Conventzia pineticola* Enderlein, 1905**

Black Sea region (Aspöck et al., 1980), Isparta, Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**84. *Conventzia psociformis* (Curtis, [1834])**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a; Aspöck et al., 1980), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**85. *Helicoconis aptera* Messner, 1965**

Kayseri (Rausch et al., 1978).

**86. *Helicoconis (Fontenelle) panticosa* Ohm, 1965**

Artvin (Aspöck et al., 1980).

**87. *Helicoconis (Helicoconis) hirtinervis* Tjeder, 1960**

Middle Anatolia (Aspöck et al., 1980).

**88. *Helicoconis (Helicoconis) sengonca* Rausch, H. Aspöck & U. Aspöck, 1978**

Burdur and Kütahya (Rausch et al., 1978).

**89. *Helicoconis (Ohmopteryx) pseudolutea* Ohm, 1965**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Antalya, İzmir (Monserrat & Hölzel, 1987), Aydın, Isparta, Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**90. *Hemisemidalis pallida* (Withycombe, [1924])**

Antalya, Aydın (Monserrat & Hölzel, 1987).

**91. *Nimboa asadeva* Rausch & H. Aspöck, 1978**

Anatolia (Meinander, 1990; Aspöck & Hölzel, 1996; Aspöck et al., 2001).

**92. *Nimboa kasyi* Rausch & H. Aspöck, 1978**

Sivas (Rausch & Aspöck, 1978).

**93. *Nimboa ressl*i Rausch & H. Aspöck, 1978**

Mersin (Aspöck & Aspöck, 1965a, Aspöck & Aspöck, 1965b) and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**94. *Parasemidalis fuscipennis* (Reuter, 1894)**

Kayseri (Canbulat, 2007a).

**95. *Semidalis alyrodiformis* (Stephens, 1836)**

Mersin (Aspöck & Aspöck, 1965a), Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), İzmir (Tuatay et al., 1972), Mersin, Antalya (Gepp, 1974), İstanbul, Konya (Monserrat & Hölzel, 1987), Kırşehir (Canbulat & Öz Saraç, 2004), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**96. *Vartiana necopinata* H. Aspöck & U. Aspöck, 1965**

Anatolia (Aspöck et al., 2001).

**Family: Dilaridae Newman, 1853**

**97. *Dilar lineolatus* Navás, [1909]**

Bursa (Navás, 1909).

**98. *Dilar turcicus* Hagen, 1858**

Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993) and Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**Family: Hemerobiidae Latreille, 1802**

**99. *Hemerobius (Hemerobius) contumax* Tjeder, 1932**

North and South Anatolia (Aspöck et al., 1980).

**100. *Hemerobius (Hemerobius) gilvus* Stein, 1863**

Ankara, Gaziantep, Konya, Samsun, Tokat (Aspöck & Aspöck, 1969a; Canbulat & Oğuz, 2013a), and Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**101. *Hemerobius (Hemerobius) handschini* Linnaeus, 1758**

Middle and South Anatolia (Aspöck et al., 1980; Aspöck & Aspöck, 1969a), Antalya, Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**102. *Hemerobius (Hemerobius) humulinus* Linnaeus, 1758**

North Anatolia (Aspöck et al., 1980).

**103. *Hemerobius (Hemerobius) lutescens* Fabricius, 1793**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Kayseri (Canbulat, 2002), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**104. *Hemerobius (Hemerobius) mican* Olivier, 1792**

The Northeast Anatolia (Aspöck et al., 1980), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars, Ardahan (Arı et al., 2008), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**105. *Hemerobius (Hemerobius) nitidulus* Fabricius, 1777**

Middle Anatolia and West Black Sea region (Aspöck et al., (1980), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Arhadan, Kars (Arı et al., 2008), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**106. *Hemerobius (Hemerobius) pini* Stephens, 1836**

Northwest Anatolia (Aspöck et al., 1980).

**107. *Hemerobius (Hemerobius) simulans* Walker, 1853**

Anatolia (Aspöck et al., 2001).

**108. *Hemerobius (Hemerobius) stigma* Stephens, 1836**

North Anatolia (Aspöck et al., 2001), Arhadan (Arı et al., 2008), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**109. *Hemerobius (Hemerobius) zernyi* Esben – Petersen, 1935**

Ankara, Osmaniye, Konya (Aspöck & Aspöck, 1966), Adıyaman (Şengonca, 1979), Ankara (Aspöck et al., 1980), Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**110. *Megalomus tineoides* Rambur, 1842**

Middle and South Anatolia (Aspöck et al., 1980).

**111. *Megalomus tortricoides* Rambur, 1842**

Middle and North Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a, Aspöck et al., 1980), Antalya, Burdur, Denizli, and Isparta, (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**112. *Micromus angulatus* (Stephens, 1836)**

Isparta (Canbulat & Kıyak, 2004).

**113. *Micromus lanosus* (Zelený, 1962)**

Ardahan (Arı & Kıyak, 2003; Arı et al., 2008).

**114. *Micromus variegates* (Fabricius, 1793)**

Northeast Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a; Aspöck et al., 1980).

**115. *Psectra diptera* (Burmeister, 1839)**

Ankara (Kıyak & Özdikmen, 1993).

**116. *Sympherobius (Niremberge) fuscescens* (Wallengren, 1863)**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Arhadan (Arı et al., 2008), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**117. *Sympherobius (Niremberge) pellucidus* (Walker, 1853)**

Northeast Turkey (Aspöck et al., 1980).

**118. *Sympherobius (Sympherobius) elegans* (Stephens, 1836)**

Konya (Monserrat & Hölzel, 1987), Burdur (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**119. *Sympherobius (Sympherobius) fallax* Navás, [1908]**

Adana (Şengonca, 1979).

**120. *Sympherobius (Sympherobius) pygmaeus* (Rambur, 1842)**

Kahramanmaraş (Şengonca, 1979), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya, Burdur, Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**121. *Wesmaelius (Kimminsia) helveticus* (H. Aspöck & U. Aspöck, 1964)**

East Black Sea region (Aspöck et al., 1980).

**122. *Wesmaelius (Kimminsia) malladai* (Navás, 1925)**

Northeast Turkey (Popov, 1986a).

**123. *Wesmaelius (Kimminsia) mortoni mortoni* (McLachlan, 1899)**

Northeast of Turkey (Aspöck et al., 1980; Popov, 1986a; Hölzel & Weiser, 1999).

**124. *Wesmaelius (Kimminsia) navasi* (Andrén, 1911)**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Gaziantep (Şengonca, 1979), and Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**125. *Wesmaelius (Kimminsia) ravus* (Withycombe, 1923)**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Arhadan (Arı et al., 2008), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**126. *Wesmaelius (Kimminsia) subnebulosus* (Stephens, 1836)**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), İzmir, Kahramanmaraş, Mersin (Şengonca, 1979), Bursa (Monserrat & Hölzel, 1987), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Burdur, Isparta, Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Amasya (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**127. *Wesmaelius (Kimminsia) vaillanti* (Navás, 1927)**

Konya (Aspöck & Aspöck, 1966), Ankara (Aspöck et al., 1980).

**128. *Wesmaelius (Wesmaelius) concinnus* (Stephens, 1836)**

Northeast Turkey (Aspöck et al., 1980), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Arhadan, and Kars (Arı et al., 2008).

**129. *Wesmaelius (Wesmaelius) quadrifasciatus* (Reuter, 1894)**

Anatolia (Aspöck et al., 2001) and Arhadan, (Arı et al., 2008).

**Family: Mantispidae Leach in Brewster, 1815****130. *Mantispa aphavexelte* H. Aspöck & U. Aspöck, 1944**

Bitlis (Aspöck, 1996), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars (Arı et al., 2008), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Bilecik, Kırklareli, Konya, Mersin, and Tunceli (Dobosz, 2007a).

**131. *Mantispa scabricollis* McLachlan, 1875**

Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), İzmir, Mersin (Şengonca, 1979; 1980b), Aydın (Monserrat & Hölzel, 1987), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Elazığ, Mardin (Satar & Özbay, 2004), Antalya, Aydın, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Adıyaman, Elazığ, Konya, Malatya, Mardin, Mersin (Dobosz, 2007a), Arhadan, Kars (Arı et al., 2008), Arhadan (Arı et al., 2008), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**132. *Mantispa styriaca* (Poda, 1761)**

Kütahya (Şengonca, 1979; 1980b), Isparta, Konya, (Şengonca 1980b), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ankara, Nevşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Tunceli (Dobosz, 2007a), Arhadan (Arı et al., 2008), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**133. *Sagittalata perla* (Pallas, 1772)**

Kütahya (Şengonca, 1979, 1980b), Bingöl (Aspöck et al., 1980), Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ankara, Erzurum, Kayseri (Dobosz, 2007a), Arhadan, Kars (Arı et al., 2008), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**Family: Myrmeleontidae Latreille, 1802****134. *Acanhaclisis mesopotamica* Hölzel, 1972**

Siirt (Özgen et al., 2012).

**135. *Acanhaclisis occitanica* (Viller, 1789)**

Konya (Esben-Petersen, 1933; Hölzel, 1972a), Ankara, İzmir (Şengonca, 1979), Niğde (Kaçirek, 1998), Adıyaman (Satar & Özbay, 2004), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Iğdır (Arı et al., 2007b).

**136. *Creoleon lugdunensis* (Viller, 1789)**

Nevşehir, Antalya (Gepp, 1974), Konya, Van (Hölzel, 1972a); Ankara, Adana, Edirne (Popov, 1977), and Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002).

**137. *Creoleon plumbeus* (Olivier, 1811)**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Antalya, Şanlıurfa, İzmir (Şengonca, 1979), Ankara (Monserrat & Hölzel, 1987), Aydın (Kaçirek, 1998), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt (Satar & Özbay, 2004), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars, Iğdır (Arı et al., 2007b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**138. *Cueta beieri* (Hölzel, 1969)**

İstanbul (Hölzel, 1969a), Adana (Popov, 1977; Aspöck et al., 1980), Osmaniye (Şengonca, 1979), Antalya (Monserrat & Hölzel, 1987), Hatay (Kaçirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Antalya, Isparta, Denizli, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Iğdır, and Kars (Arı et al., 2007b).

**139. *Cueta lineosa* (Rambur, 1842)**

Malatya (Hölzel, 1969a), Antalya (Gepp, 1974), Denizli (Monserrat & Hölzel, 1987), Mersin, (Şengonca, 1979), Elazığ (Özbay et al., 2005), Adıyaman, Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Antalya, Aydın, and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**140. *Delfimeus friedeli* (Hölzel, 1972)**

Kırıkkale (Hölzel, 1972a), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Burdur, Isparta, and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**141. *Delfimeus irroratus* (Olivier, 1811)**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Ankara, Isparta, Konya, Mersin (Hölzel, 1972a), Adana, Hatay (Kaçirek, 1998), Adana (Arı & Kıyak, 2000; Popov, 1977), Antalya, Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ardahan, Iğdır (Arı et al., 2007b), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**142. *Delfimeus punctatus* Navás, 1914**

Southeast Turkey (Navás, 1914).

**143. *Dendroleon pantherinus* (Fabricius, 1787)**

Rize (Hölzel, 1972a) and Iğdır (Arı et al., 2007b).

**144. *Deutoleon turanicus* Navás, 1927**

Ardahan (Arı et al., 2007b).

**145. *Distoleon curdicus* Hölzel, 1972**

Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Van (Hölzel, 1972a; Şengonca, 1979), and Ardahan (Arı et al., 2007b).

**146. *Distoleon kabulensis* Hölzel, 1972**

Elazığ (Hölzel, 1972a) and Kayseri (Canbulat, 2007a).

**147. *Distoleon laticollis* (Navás, 1913)**

Adana and Mersin (Şengonca, 1979).

**148. *Distoleon luteomaculatus* Hölzel, 1972**

Iğdır (Arı et al., 2007b).

**149. *Distoleon tetragrammicus* (Fabricius, 1798)**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Aydın, İzmir, Mersin (Şengonca, 1979), Adana (Arı & Kıyak, 2000), Hatay, Mersin, (Kačirek, 1998); Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b); Çanakkale (Canbulat & Kıyak 2002a), Diyarbakır, Şırnak (Satar & Özbay, 2004), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Arhaden (Arı et al., 2007b).

**150. *Ecthromyrmex sehiterolmez* Koçak & Kemal, 2008**

Hakkari (Koçak & Kemal, 2008a), Diyarbakır (Koçak & Kemal, 2008b), and Siirt (Özgen et al., 2012)

**151. *Euroleon nostras* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)**

Ankara (Hölzel, 1972a), Ardahan, Iğdır (Arı et al., 2007b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**152. *Gymnocnemia variegata* (Schneider, 1845)**

Konya (Canbulat & Kıyak, 2003a) and Elazığ (Satar & Özbay, 2003; Özbay et al., 2005).

**153. *Macronemurus amoenus* (Hölzel, 1972)**

Denizli (Canbulat & Kıyak, 2004) and Elazığ (Özbay et al., 2005).

**154. *Macronemurus appendiculatus* (Latreille, 1807)**

Amasya (Hölzel, 1987).

**155. *Macronemurus bilineatus* Brauer, 1868**

Amasya (Navás, 1932), Konya (Esben-Petersen, 1933), Afyon, Ankara, Konya, Van (Hölzel, 1972a, 1987), Nevşehir (Gepp, 1974), Edirne (Popov, 1977), Mersin, İzmir (Şengonca, 1979), Çanakkale, Niğde (Kačirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, (Canbulat & Kıyak, 2005b), Kars, Iğdır (Arı et al., 2007b), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**156. *Macronemurus persicus* (Navás, 1915)**

Adana and İzmir (Kačirek, 1998).



**157. *Megistopus flavicornis* (Rossi, 1790)**

Malatya (Hölzel, 1972a), Antalya, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Kars (Ari et al., 2007b).

**158. *Mesonemurus steineri* Hölzel, 1972**

Ağrı (Hölzel, 1972a, 1987) and Iğdır (Ari et al., 2007b).

**159. *Myrmecaelurus acerbus* (Walker, 1853)**

Konya (Esben-Petersen, 1933).

**160. *Myrmecaelurus atrifrons* (Hölzel, 1970)**

Konya and Ağrı (Hölzel, 1972a).

**161. *Myrmecaelurus curdicus* (Hölzel, 1972),**

Ağrı (Hölzel, 1972a).

**162. *Myrmecaelurus glaseri* (Hölzel, 1972)**

Konya (Hölzel, 1972a).

**163. *Myrmecaelurus major* McLachlan, 1875**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Isparta, Malatya (Hölzel, 1969), Eskişehir, Isparta, Konya, Malatya, Van (Hölzel, 1972a), Konya (Şengonca, 1979), Ankara (Kaçirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Adıyaman, Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Iğdır, and Kars (Ari et al., 2007b).

**164. *Myrmecaelurus trigrammus* (Pallas, 1771)**

Antalya (Schneider, 1845), Konya (Esben-Petersen, 1933), Ankara, Eskişehir, Van (Hölzel, 1972a), Edirne (Popov, 1977), Aydın, İzmir, Mersin, (Şengonca, 1979), İstanbul (Monserrat & Hölzel, 1987), Hatay, Mersin, Denizli, Burdur (Kaçirek, 1998), Adana (Ari & Kıyak, 2000), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak (Satar & Özbay, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Burdur, Isparta, Denizli, Aydın, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Arhadan, Iğdır, Kars (Ari et al., 2007b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**165. *Myrmecaelurus spectabilis* Navás, 1912**

Bolu (Canbulat, 2007a).

**166. *Myrmecaelurus varians* Navás, 1913**

Bursa (Hölzel, 1972a; Canbulat, 2007b).

**167. *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Middle Anatolia (Aspöck & Aspöck, 1969a), Mersin (Hölzel, 1972a), İzmir (Şengonca, 1979), and Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**168. *Myrmeleon lagopus* Gerstaecker, 1897**

According to Stange (2004) this species is valid.  
Mardin (Gerstaecker, 1894).

**169. *Myrmeleon hyalinus distinguendus* Rambur, 1842**

Antalya, Mersin (Şengonca, 1979), Adana, and Hatay (Kačirek, 1998).

**170. *Myrmeleon inconspiuus* Rambur, 1842**

Antalya (Gepp, 1974; Canbulat & Kıyak, 2005b), Adıyaman, Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Kars (Arı et al., 2007b), and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**171. *Myrmeleon noacki* Ohm, 1965**

Konya (Aspöck et al., 1980), Burdur, Mersin (Kačirek, 1998); Antalya, Burdur, and Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**172. *Nedroledon anatolicus* Navás, 1914**

Bursa (Hölzel, 1972a; Aspöck et al., 1980) and Adana (Kačirek, 1998).

**173. *Nedroledon striatus* Hölzel, 1972**

Malatya (Şengonca, 1979) and Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004).

**174. *Neuroleon (Ganussa) tenellus* (Klug, 1834)**

Adana, Siirt (Şengonca, 1979), Mersin (Aspöck et al., 1980), Antalya (Monserrat & Hölzel, 1987), Adana (Kačirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Batman, Diyarbakır, Mardin (Satar & Özbay, 2004), Antalya, Aydın, and Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**175. *Neuroleon (Neuroleon) assimilis* (Navás, 1914)**

İzmir (Şengonca, 1979), İstanbul (Monserrat & Hölzel, 1987), Mersin (Kačirek, 1998), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Batman, Diyarbakır, Mardin (Satar & Özbay, 2004), Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Arhadan, Iğdır (Arı et al., 2007b), and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**176. *Neuroleon (Neuroleon) diana* Hölzel, 1972**

Adıyaman (Şengonca, 1979).

**177. *Neuroleon (Neuroleon) egenus* (Navás, 1914)**

Aydın, Burdur (Kačirek, 1998), Adıyaman, Batman, Diyarbakır (Satar & Özbay, 2004), Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Iğdır (Arı et al., 2007b).

**178. *Neuroleon (Neuroleon) jucundus* Navas, [1924]**

According to Stange (2004) this species is valid  
Bursa (Navás, 1921).

**179. *Neuroleon (Neuroleon) microstenus* (McLachlan, 1898)**

Neveşehir (Gepp, 1974), Ankara (Hölzel, 1972a), Adana (Şengonca, 1979), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Diyarbakır, Mardin (Satar & Özbay, 2004), and Iğdır (Arı et al., 2007b).

**180. *Neuroleon (Neuroleon) nemausiensis* (Borkhausen, 1791)**

Middle Black Sea region (Aspöck et al., 1980), Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b), Arhadan, Iğdır (Arı et al., 2007b).

**181. *Nicarinus poecilopterus* (Stein, 1863)**

Adana (Şengonca, 1979), Mersin (Kaçirek, 1998), Antalya, Denizli (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Arhadan, (Arı et al., 2007b).

**182. *Palpares hispanus turcicus* Koçak, 1976**

Hakkari (Koçak, 1976; Canbulat, 2007b).

**183. *Palpares libelluloides* (Linnaeus, 1764)**

Konya (Esben-Petersen, 1933), Antalya (Gepp, 1974), Ankara, Adana (Popov, 1977), Mersin, İzmir, İstanbul, Muğla, (Şengonca, 1979), Burdur, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, (Kaçirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Çanakkale (Canbulat & Kıyak, 2002a), Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa (Satar & Özbay, 2004), Kırşehir (Canbulat & Özsaraç, 2004), Elazığ (Özbay et al., 2005), Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Iğdır (Arı et al., 2007b), Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a), Amasya, and Çorum (Canbulat & Oğuz, 2013b).

**184. *Palpares solidus* (Gerstaecker, [1894])**

Adana (Şengonca, 1979) and Mardin (Hölzel, 1972a).

**185. *Pseudofornicaleo gracilis* (Klug, [1834])**

Hatay (Kaçirek, 1998).

**186. *Solter ledereri* Navás, 1912**

Denizli (Monserrat & Hölzel, 1987), Adıyaman, Diyarbakır, Mardin (Satar & Özbay, 2004), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Iğdır (Arı et al., 2007).

**187. *Solter liber* Navás, 1912**

Adana (Arı & Kıyak, 2000).

**188. *Solter pulcher* Hölzel, 1967**

Kayseri (Şengonca, 1979).

**189. *Synclisis baetica* (Rambur, 1842)**

İzmir (Şengonca, 1979) and Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b).

**Family: Nemopteridae Burmeister, 1839****190. *Croce schmidtii* (Navás, 1927)**

Adiyaman (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**191. *Dielocroce baudii* (Griffini, 1895)**

Diyarbakır (Satar, 2005), Adiyaman, and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**192. *Dielocroce ephemera* (Gerstaecker, [1834])**

Mardin (Gerstaecker, 1894; Navás, 1910; Şengonca, 1981b), Batman (Satar & Özbay, 2004), Adiyaman, and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**193. *Dielocroce modesta* Hölzel, 1975**

Adiyaman and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**194. *Lertha extensa* (Olivier, 1811)**

Şanlıurfa, Hakkari (Şengonca, 1979; 1981b), Hatay (Tjeder, 1970), Kahramanmaraş, Malatya (Hölzel, 1968) Şanlıurfa (Kačirek, 1998), Van (Koçak & Kemal, 2002), Diyarbakır, Mardin, Siirt (Satar & Özbay, 2004), Iğdır, Kars (Arı et al., 2008), Adiyaman, Gaziantep, Diyarbakır, and Mardin (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**195. *Lertha ledereri* (Selys – Longchamps, 1866)**

Konya (Esben-Petersen, 1933; Hölzel, 1968; Aspöck et al., 1984), İzmir, Kayseri (Popov, 1970), Denizli (Aspöck et al., 1980), Niğde (Kačirek, 1998), Kayseri (Canbulat & Kıyak, 2002b), Antalya, Burdur, Denizli, Isparta (Canbulat & Kıyak, 2005b), Aksaray, Ankara, Nevşehir, and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**196. *Lertha palmonii* (Tjeder, 1970)**

Van (Koçak & Kemal, 2002), Mardin (Koçak & Kemal, 2008b), Adiyaman, Gaziantep, Mardin, and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**197. *Lertha schmidtii* (H. Aspöck & U. Aspöck & Hölzel, 1984)**

Eskişehir, Konya (Aspöck et al., 1984), Antalya (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ankara, Kırşehir, and Nevşehir (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**198. *Lertha sheppardi* (Kirby, 1904)**

Amanos mountains (Navás, 1910, 1912; Hölzel, 1968), Denizli (Şengonca, 1979), Mersin (Şengonca, 1981b), Diyarbakır, and Şanlıurfa (Satar & Özbay, 2004).

**199 *Lertha vartianae* H. Aspöck & U. Aspöck & Hölzel, 1984**

Konya, Karaman, Antalya, Mersin (Aspöck et al., 1984), and Burdur (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**200. *Nemoptera aegyptiaca* Rambur, 1842**

Hatay (Popov, 1970), Diyarbakır, and Şanlıurfa (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**201. *Nemoptera coa* (Linnaeus, 1758)**

Bursa, İstanbul, İzmir (Popov, 1970), Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Muş (Şengonca, 1981b), and Muğla (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**202. *Nemoptera sinuata* Olivier, 1811**

Antalya (Schneider, 1845), Amasya, Tokat (Navás, 1910), Taurus. (Navás, 1932), Konya (Esben-(Esben - Petersen, 1933), Hakkari (Gepp, 1974), Amasya, Antalya, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin (Hölzel, 1968; Şengonca, 1981b), Hakkari, İzmir, Kütahya, (Şengonca, 1979), Adana (Kačirek, 1998; Arı & Kıyak, 2000), Kayseri (Canbulat, & Kıyak, 2002b), Şanlıurfa (Satar & Özbay, 2004), Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), Ardahan (Arı et al., 2007), Adıyaman, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bitlis, Erzurum, Kastamonu, Mardin, and Tunceli (Dobosz & Ábrahám, 2009).

**Family: Osmylidae Leach in Brewster, 1815**

**203. *Osmylus cilicicus* Krüger, 1913**

İzmir (Şengonca, 1979), Artvin, and Bolu (Dobosz, 2007b).

**204. *Osmylus elegantissimus* Kozhantshikov, 1951**

Northeast Anatolia (Aspöck et al., 2001) and Tokat (Canbulat & Oğuz, 2013a).

**205. *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763)**

West Anatolia (Aspöck et al., 1980), Antalya, Burdur, Isparta, Muğla (Canbulat & Kıyak, 2005b), and Border of Ardahan and Erzurum (Arı et al., 2008)

**206. *Osmylus multiguttatus* McLachlan, 1870**

Trabzon (McLachlan, 1870), Adana, Erzurum, Tunceli (Dobosz, 2007b), and Kayseri (Canbulat, 2013b)

**Family: Sisyridae Handlirsch, 1908**

**207. *Sisyra nigra* (Retzius, 1783)**

Yalova (Berber & Canbulat, 2009)

## References

- Ábrahám L. & Mészáros Z, 2002; Ascalaphid studies I. New genera and species of ascalaphids from Palaearctic region (Neuroptera: Ascalaphidae). *Acta phytopathologica et entomologica hungarica*, 37, 385–405.
- Aistleitner, E., 1982: *Libelloides jungei* sp. n., eine neue Ascalaphide aus der Türkei (Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). *Entomofauna*, 3(14), 209–216.
- Arı, I. & Kıyak, S., 2000: New and Additional Distributional and Faunistic Data of Turkish Planipennia. *Journal of Entomological Research Society*, 2(1), 9–15.

- Ari, I. & Kiyak, S.**, 2003: *Micromus lanosus* (Zelený, 1962) (Neuroptera: Hemerobiidae) New to the Fauna of Turkey. *Acta Entomologica Slovenica*, 11(2), 91–92.
- Ari, I., Aktaş, M., Kiyak, S.**, 2007a: Notes on the Chrysopidae (Neuroptera) Fauna of Ardahan, Iğdır and Kars Provinces of Turkey. *Turkish Journal of Zoology* 31(3), 201–208.
- Ari, I., Aktaş, M., Kiyak, S.**, 2007b: Contributions to the Fauna of Turkish Myrmeleonidae (Neuroptera, Insecta) from Ardahan, Iğdır, and Kars. *Turkish Journal of Zoology*, 31(3), 229–234.
- Ari, I., Aktaş, M., Kiyak, S.**, 2008: Contribution to the fauna of Turkish neuropteran insects from Ardahan, Iğdır and Kars provinces (Neuroptera, Insecta). *Munis Entomology & Zoology*, 3, 177–184
- Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1965a: Die Neuropteren Vorderasiens. I. Coniopterygidae. *Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, 24(2), 159–181.
- Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1965b: Vorläufige Mitteilung über die Coniopterygiden Vorderasiens (Neuroptera). *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 12, 17–23.
- Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1966: Neue Hemerobiiden aus Vorderasien (Insecta, Planipennia). *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 13, 74–80.
- Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1969a: Die Neuropteren Mitteleuropas. Ein Nachtrag zur Synopsis der Systematik. Ökologie und Biogeographie der Neuropteren Mitteleuropas. *Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 1969*, 17–68.
- Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1969b: Die Neuropteren Mitteleuropas-eine faunistische und zoogeographische Analyse. *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz*, 44, 31–48.
- Aspöck, H., Aspöck, U. & Hölzel, H.**, 1980: *Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas*, Goecke & Evers, Krefeld. Vol 1, 495 pp., Vol 2, 355 pp.
- Aspöck, H., Aspöck, U. & Hölzel, H.**, 1984: Neue Spezies der Genera *Kirbynia* Navás und *Lertha* Navás aus Vorderasien und Bemerkungen Über *Olivierina extensa* (Olivier) (Neuropteroidea: Planipennia: Nemopteridae). *Entomologische Zeitschrift*, 94, 113–121.
- Aspöck, H. & Hölzel, H.**, 1996: The Neuropteroidea of North Africa, Mediterranean Asia and of Europe: a comparative review (Insecta), in: Canard, M., Aspöck, H., Mansell, M.W (eds.), Pure and Applied Research in Neuropterology. Proceedings of the Fifth International Symposium on Neuropterology, p. 31–86.
- Aspöck, H., Hölzel, H. & Aspöck, U.**, 2001: *Kommentierter Katalog der Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis*. *Denisia* 2, 606 pp.
- Aspöck, U.**, 1987: What we know and what we don't know about *Isoscelipteron fulvum* (Neuropteroidea: Planipennia: Berothidae), a peculiar insect of the European fauna. *Biologia Gallo-Hellenica* 13, 91–98.

- Aspöck, U.**, 1989: *Nyrma kervillea* Navás-eine Berothide! (Neuropteroidea: Planipennia). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 41, 19–24.
- Aspöck, U.**, 1996: Die Mantispiden Europas (Neuropteroidea: Neuroptera: Mantispidae). In: *Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums über Entomofaunistik in Mitteleuropa*, (SIEEC, 4–9 September 1994, München), 99, 224–230.
- Aspöck, U. & Aspöck, H.**, 1979: *Nyrma kervillea* Navás - Wiederentdeckung einer systematisch isolierten Hemerobiiden-Spezies in Kleinasien. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 31(3/4), 92–96.
- Aspöck, U. & Aspöck, H.**, 1980: Das genus *Isoscelipteron* Costa, 1863 (Neuropteroidea: Planipennia: Berothidae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 32, 65–74.
- Aspöck, U. & Aspöck, H.**, 1994: Paradoxe Verbreitungsbilder von Neuropteroidea (Insecta: Raphidioptera, Neuroptera). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 46, 30–44.
- Aspöck, U., Aspöck, H. & Hölzel, H.**, 1978: *Bubopsis andromache* n. sp.—eine neue Spezies der Familie Ascalaphidae (Neuropteroidea, Planipennia) aus dem östlichen Mittelmeerraum. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 30, 113–116.
- Bahadıroğlu, C. & Daymaz, Y.**, 2001: Kahramanmaraş İlinde Chrysopidae (Neuroptera) Familyasına ait Türler ve Biyolojik Özellikleri, *Fen ve Mühendislik Dergisi*, 4(2), 30–36.
- Berber & Canbulat,**, 2009: A reare species recorded for Turkey; *Sisyra nigra* (Insecta, Neuroptera, Sisyridae) SAU Fen – Edebiyat Dergisi. 21-26.
- Brauer, F.**, 1864: Entomologische Beiträge. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologische-Botanischen Gesellschaft in Wien*, 14, 891–902.
- Canard, M. & Laudeho, Y.** 1977: Les Nevropteres captures au piege de McPhail dans les oliviers in Grece. 1. L'ile d'Aguistri. *Biologia Gallo-Hellenica*, 7(I–II), 65–75.
- Canbulat, S.**, 2002: Contributions to the knowledge of Turkish Neuroptera from Kayseri Province (Insecta; Neuroptera). *Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University*, 15(3), 633–639.
- Canbulat, S.**, 2007a: Contributions to the knowledge of the lacewing fauna of Turkey (Insecta; Neuroptera), with some ecological notes. *Entomological News*, 118(3): 303-310.
- Canbulat, S.**, 2007b: A check list of Turkish Neuroptera with annotating on provincial distributions. *Zootaxa*.1552: 35-52.
- Canbulat, S.**, 2007c: On the occurrence of *Euroleon nostras* (Fourcroy, 1785) in the Turkish ant-lion fauna (Neuroptera, Myrmeleontidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 40, 232.
- Canbulat, S.**, 2013a: Two new records of the Coniopteryx (Neuroptera, Coniopterygidae) species fort he turkish fauna, *Turkish Journal of Zoology*. 37: 242-245.

- Canbulat, S.**, 2013b: Redescription of *Osmylus multiguttatus* McLachlan, 1870 (Neuroptera: Osmylidae) with distributional remarks. *Zootaxa*, 3741 (3): 385–390.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2000: On the Faunistic and Systematical Studies of Chrysopidae (Insecta: Neuropteroidea: Planipennia) Species of Çanakkale Province. *Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University*, 13(4), 1037–1045.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2002a: A study on the Neuroptera Fauna of Çanakkale Province (Insecta: Neuroptera). *Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University*, 15(2), 413–418.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2002b: *Nineta pallida* (Schneider, 1846) new to Turkey (Neuroptera: Chrysopidae). *Journal of Entomological Research Society*, 4(1), 11–14.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2003a: A new record of antlions for the Turkish fauna (Insecta, Neuroptera, Myrmeleontidae). *Journal of Entomological Research Society*, 5(1), 17–20.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2003b: A new species of the Genus *Nineta* from Turkey (Neuroptera: Chrysopidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 50(1), 129–131.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2004: Four species of Lacewing (Insecta; Neuroptera) new to the fauna of Turkey. *Zoology in the Middle East*, 32, 113–114.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2005a: A new species of the Genus *Dichochrysa* from Turkey (Neuroptera: Chrysopidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 52(2), 225–2281.
- Canbulat, S. & Kiyak, S.**, 2005b: Contribution of the Fauna of Neuroptera (Insecta) of South-Western Anatolia. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, 13, 9–60.
- Canbulat, S. & Oğuz, M.C.**, 2013a: Contribution to Neuroptera (Insecta) fauna of Tokat province of Turkey. *Manas Journal of Agriculture and life sciences*. 3(1): 55-72.
- Canbulat, S. & Oğuz, M.C.**, 2013b: Çorum ve Amasya illeri Neuroptera (Insecta) faunası (Turkey). *Nevşehir bilim ve teknoloji dergisi*. 3(2): 37-55.
- Canbulat, S. & Öz Saraç, Ö.**, 2004: Neuropterida (Insecta; Neuroptera, Raphidioptera) Fauna of Çiçekdağı (Kırşehir province). *Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University*, 17(1), 1–9.
- Dobosz, R.** 2007a: New faunistics data on Mantispidae (Neuroptera) from Turkey. *Rocznik Muzeum Górnoślaskiego w Bytomiu, Entomologia [=Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology]* 14-15:29-34.
- Dobosz, R.** 2007b: New faunistics data on Osmylidae (Neuroptera) from Turkey. *Rocznik Muzeum Górnoślaskiego w Bytomiu, Entomologia [=Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology]* 14-15:35-37.
- Dobosz, R. & Ábrahám, L.**, 2009: Contribution to the knowledge of the Turkish tail-wings (Neuroptera: Nemopteridae). *Natura Somogyiensis*. 15: 113-126.



- Esben-Petersen, P.**, 1933: Notizen zur Neuropteren-und Mecopteren - fauna Kleinasiens. *Konowia*, 11, 163–167.
- Gepp, J.**, 1974: Beitrag zur Kenntnis der Neuropteren der Türkei. *Entomologische Berichten*, 34, 102–104.
- Gerstaecker, A.**, 1894: Ueber neue und weniger gekannte Neuropteren aus der familie Megaloptera Burm. *Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Neu-Vorpommern u. Rugen in Greifswald*, 25, 93–173.
- Ghahari, H., Satar, A., Anderle, F., Tabari, M., Havaskary, M., and Ostovan, H.**, 2010: Lacewings (Insecta: Neuroptera) of Iranian rice fields and surrounding Grasslands. *Munis Entomology & Zoology*, 5(1), 65-72.
- Hölzel, H.**, 1965: Neue oder wenig bekannte Chrysopiden aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums (Chrysopidae, Planipennia). *Annalen des Naturhistorischen Museums Wien.*, 68, 453–463.
- Hölzel, H.**, 1966: Beschreibung einer neuen europäischen Neuropterenart-*Chrysopa raddai* n.sp. (Planipennia-Chrysopidae). *Entomologisches Nachrichtenblatt*, 13(7), 72–73.
- Hölzel, H.**, 1967a: Die Neuropteren Vorderasiens II. Chrysopidae. *Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, 26(1), 19–45.
- Hölzel, H.**, 1967b: Zwei neue *Chrysopa*-Arten aus Anatolien (Neuroptera, Chrysopidae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 16, 92–95.
- Hölzel, H.**, 1968: Die Neuropteren Vorderasiens III. Nemopteridae. *Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, 27(1), 37–47.
- Hölzel, H.**, 1969: Beitrag zur Systematik der Myrmeleoniden. *Ann. Naturhistor. Mus. Wien*, 73, 275–320.
- Hölzel, H.**, 1972a: Die Neuropteren Vorderasiens IV. Myrmeleonidae. *Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland*, 1, 3–103.
- Hölzel, H.**, 1972b: Eine neue Chrysopiden-Art aus Südeuropa-*Anisochrysa (Cunctochrysa) baetica* n. sp. (Planipennia, Chrysopidae). *Entomologische Zeitschrift*, 82(19), 217–221.
- Hölzel, H.**, 1973: Neue Chrysopidenarten aus dem Iran (Planipennia). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 25(1/2), 41–46.
- Hölzel, H.**, 1978: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Suarius* Navás: Die Arten des *nanus*-Komplexes (Planipennia, Chrysopidae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen*, 30, 3–12.
- Hölzel, H.**, 1987: Revision der Distoleonini. I. Die Genera *Macronemurus* Costa, *Geyria* Esben-Petersen and *Mesonemurus* Navás (Planipennia, Myrmeleonidae). *Entomofauna Zeitschrift für Entomologie*, 8(27), 369–412.
- Hölzel, H.**, 1998: Zoogeographical features of Neuroptera of the Arabian peninsula. *Acta Zoologica Fennica*, 209, 129–140.
- Hölzel, H. & Ohm, P.**, 1986: *Chrysopa nigrescens* n. sp.—eine neue Chrysopiden-Spezies aus Anatolien (Neuropteroidea: Planipennia: Chrysopidae). *Entomologische Zeitschrift*, 96, 29–31.

- Hölzel, H. & Wieser, C.**, 1999: Die Netzflüger Kärntens, Eine zusammenfassende Darstellung der Autökologie und Chorologie der Neuropterida (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) Kärntens. *Carinthia II*, 189/109, 361–429.
- Kačirek, A.**, 1998: Beitrag zur Kenntnis der Familien Myrmelontidae, Ascalaphidae and Nemopteridae (Neuroptera) der Türkei. *Klapalekiana*, 34, 183–188.
- Kemal, M. & Koçak, A. Ö.**, 2006: A new genus and a new species of Ascalaphidae for the fauna of Turkey (Planipennia). *Centre for Entomological Studies, Miscellaneous Papers*, 99, 1–3.
- Kıyak, S. & Özdikmen, H.**, 1993: Über Einige Neuropterenarten Von Soğuksu Nationalpark (Kızılcahamam, Ankara). *Priamus*, 6(3/4), 156–160.
- Koçak, A. Ö.**, 1976: A new subspecies of Myrmeleonidae (Neuroptera) from Turkey. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 25, 97–100.
- Koçak, A. Ö. & Kemal, M.**, 2002: Van'da üç nadir Sinirkanatlı türü hakkında (Planipennia, Ascalaphidae, Nemopteridae). *Centre for Entomological Studies, Miscellaneous Papers*, 87, 5–8.
- Koçak, A. Ö. & Kemal, M.**, 2008a: Notes on some rare Planipennia species in east Turkey Neuroptera, Myrmeleonidae, Sacalaphidae, Nemopteridae). *CesaNews* 18:1-5.
- Koçak, A. Ö. & Kemal, M.**, 2008b: Description of a new species *Echthromyrmex sehittlerolmez* sp. n. (Planipennia, Myrmeleonidae) from south east Turkey. *Centre for Entomological Studies, Miscellaneous Papers*, 138:4-5.
- Kovancı, B. & Canbulat, S.**, 2007: A new species of the genus *Nothochrysa* McLachlan 1868 from northwestern Turkey (Neuroptera: Chrysopidae) with a key to western Palaearctic species. *Annales de la Societe entomologique de France*, 43(2), 165–168.
- Kovancı, B. & Kovancı, O. B.**, 2007: An annotated list of the green lacewings (Neuroptera: Chrysopidae) of northwestern Turkey, with new records, their spatio-temporal distribution, and harboring plants. *Entomological News, Philadelphia* 118:90-104.
- Letardi, A.**, 1991: Ascalafidi europei e del Medio Oriente della collezione del Museo di Zoologia dell'Università di Roma (Planipennia, Ascalaphidae). *Fragmenta Entomologica Roma*, 23(1), 35–44.
- McLachlan, R.**, 1870: New species, &c., of Hemerobiina—second series (Osmylus). *Entomologist's Monthly Magazine*, 6, 195–201.
- McLachlan, R.**, 1871: An attempt towards a systematic classification of the family Ascalaphidae. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*, 11, 219–276.
- McLachlan, R.**, 1873: An attempt towards a systematic classification of the family Ascalaphidae. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 11, 219–276.
- McLachlan, R.**, 1893: On species of *Chrysopa* observed in the eastern Pyrenees; together with descriptions of, and notes on, new or little-known Palaearctic forms of the genus. *Transactions of the Entomological Society of London*, 227–234.
- Meinander, M.**, 1972: A revision of the family Coniopterygidae (Planipennia). *Acta Zoologica Fennica*, 136, 1–357.

- Meinander, M.**, 1990: The Coniopterygidae (Neuroptera: Planipennia). A check-list of the species of the world, descriptions of new species and other new data. *Acta Zoologica Fennica*, 189, 1–95.
- Monserrat, V. J.**, 1979: *Coniopteryx arcuata* Kis, 1965, nueva para la fauna Espanola (Neuropt. Coniopterygidae). *Graellsia*, 33, 103–106.
- Monserrat, V. J. & Hölzel, H.**, 1987: Contribucion al conocimiento de los neuropteros de Anatolia (Neu. Planipennia). *Revista Espanola de Entomologia*, 63, 133–142.
- Navás, L.**, 1909: Monografía de la familia de los Diláridos (Ins. Neur.). *Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona*, (3)7, 619–671.
- Navás, L.**, 1910: Monografía de los Nemoptéridos (Insectos Neurópteros). *Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona*. 3(8): 341–408.
- Navás, L.**, 1912: Fam. Nemopteridae. Neuroptera. in *Wytman's Genera Insectorum, Bruxelles*, 136, 1–23.
- Navás, L.**, 1914: Neuroptera asiatica. III series. *Revue Russe d'Entomologi*, 14, 6–13.
- Navás, L.**, 1921: Comunicaciones entomológicas. 4. Insectos exóticos nuevos, críticos o poco conocidos. *Revista de la [Real] Academia de Ciencias Exactas Fisico-Químicas y Naturales de Zaragoza* 1(6): 61–81.
- Navás, L.**, 1926: Insecta orientalia. *Memorie dell'Accademia Pontifica dei Nuovi Lincei, Roma* 2(9): 111–120.
- Navás, L.**, 1932: Insecta orientalia. *Memorie dell'Accademia Pontifica dei Nuovi Lincei, Roma* 2(16): 913–919.
- Navás, L.**, 1933: De las cazas del Sr. Gadeau de Kerville en el Asia Menor. 5. *Congres International d'Entomologie Paris. Compte Rend*, 221–225.
- Onar, N. & Aktaç, N.**, 2002: Edirne yöresi Chrysopidae (Neuroptera) Faunası üzerine Taksonomik ve Faunistik Arařtırmalar. *Türk. entomoloji. dergisi.*, 26(2), 121–134.
- Özbay, C., Satar, A. & Akaya, A.**, 2005: Neuroptera Fauna of Elazığ Province (Turkey). *Boletin Sociedad Entomologica Aragonesa*, 36, 302.
- Özgen, İ., Satar, A., Tusun, S.**, 2012: Abundance Neuroptera species recorded in pistachio and cherry orchards of Southeastern Anatolia of Turkey. *Munis Entomology & Zoology*. 7(1): 536–542.
- Popov, A.**, 1970: Verbreitung der europäischen Nemopteriden-Arten (Neuroptera), Academie Bulgare Des Sciences. *Bulletin De L'Institut De Zoologie Et Musee*, 32, 5–31.
- Popov, A.**, 1977: Wissenschaftliches Ergebnis der Zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Türkei. Raphidioptera, Neuroptera and Mecoptera. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 39, 271–277.
- Popov, A.**, 1986a: Hemerobiiden aus Bulgarien (Neuroptera). *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*, 62, 323–331.
- Popov, A.**, 1986b: Coniopterygiden aus Bulgarien (Neuroptera). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 30, 167–171.

- Popov, A.**, 2004: The Ascalaphidae (Neuroptera) of the Balkan Peninsula. *Denisia*, 13, 229–237.
- Rausch, H. & Aspöck, H.**, 1978: Zwei neue Spezies des Genus *Nimboa* Navás (Neuroptera, Coniopterygidae) aus Vorderasien. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen*, 30(1/2), 13–16.
- Rausch, H., Aspöck, H. & Aspöck, U.**, 1978: Beschreibung von *Helicoconis sengonca* n. sp., einer neuen Coniopterygiden-Spezies aus Anatolien, und Bemerkungen über *Helicocoiis aptera* Messner, 1965 (Neuropteroidea, Planipennia). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen*, 30(1/2), 25–28.
- Satar, A.**, 2005: *Dielocroce baudii* (Griffini, 1895), is a new Nemopterid for Anatolia (Nemopteridae, Neuroptera). *Acta Entomologica Slovenica*, 13, 65–69.
- Satar, A. & Özbay, C.**, 2002: *Bubopsis zarudnyi* Alexandrov-Martynova, 1926 (Neuroptera: Ascalaphidea) New to Turkey. *Boletín Dela S.E.A.*, 30, 192.
- Satar, A. & Özbay, C.**, 2003: *Gymnocnemis variegata* (Schneider, 1845), second record to Turkish Fauna (Neuroptera: Myrmeleontidae) *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 31, 387.
- Satar, A. & Özbay, C.**, 2004: Remarks on Neuroptera of Southeastern Turkey. *Entomologica Fennica*, 15, 119–224.
- Schneider, W. G.**, 1845: Verzeichnis der von Hern. Prof. Dr. Loew im Sommer 1842 in der Türkei und Kleinasien gesammelten Neuroptera, nebst kurzer Beschreibung der neuen Arten. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 6, 110–116, 153–155.
- Şengonca, Ç.**, 1978: *Berotha fulva* (Costa 1855) — neu für die Türkei (Planipennia, Berothidae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 2, 103–106.
- Şengonca, Ç.**, 1979: Beitrag zur Neuropterenfauna der Türkei. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 28(1), 10–15.
- Şengonca, Ç.**, 1980a: Türkiye Chrysopidae (Neuroptera) Faunası Üzerine Sistematiik ve Taksonomik Araştırmalar, T.C. Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Matbaa Şubesi Müdürlüğü, 138 s.
- Şengonca, Ç.**, 1980b: Türkiye Mantispidae (Insecta: Neuroptera) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar, *Tübitak VII. Bilim kongresi, TBAG Biyoloji Seksiyonu*, 6–10 Ekim 1980 Kuşadası- Aydın. Tübitak yayınları, 545, 457–473.
- Şengonca, Ç.**, 1981a: Die Neuropteren Anatoliens I. Chrysopidae. *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft*, 71, 121–137.
- Şengonca, Ç.**, 1981b: Türkiye Nemopteridae (Insecta: Neuroptera) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar II. Faunistik. *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 5(2), 101–114.
- Sziráki, G.**, 1998: An annotated checklist of the Ascalaphidae species known from Asia and from the Pacific Islands. *Rovartani Közlemények*, 59, 57–72.
- Tjeder, B.**, 1970: A new *Lertha* from Israel (Neuroptera; Nemopteridae). *Entomologica scandinavica Lund.*, 1, 219–222.
- Tuatay, N., Kalkandelen, A. & Aysev, N.**, 1972: Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961–1971), T.C. Tar. Bak. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müd. Yayınları mesleki kitaplar serisi, 119 s.

Received / Prejeto: 11. 4. 2014