

ICONES
PLANTARUM RARIORUM.

E D I T Æ

A

NICOLAO JOSEPHO JACQUIN
BOTANICES PROFESSORE.

VOL. I.



VINDOBONÆ

PROSTANT APUD CHRISTIANUM FRIDERICUM WAPPLER; LONDINI APUD B. WHITE ET FILIUM;
LUGDUNI BATAVORUM APUD S. ET J. LUCHTMANS; ARGENTORATI APUD A. KÖNIG;
BIBLIOPOLAS.

AB ANNO 1781 AD 1786.



PRÆFATIO.

A tempore, quo Floræ Austriacæ Hortoque botanico Vindobonensi imposui finem, non destiti examini submittere stirpes rariores, cum in memorato horto Cæsareoque Schœnbrunnensi novas hospites, tum in excursionibus herbariis factas noviter obvias; quin genio indulgens et consuetudini, plurimarum earundem figuras etiam pingendas curavi, quarum deinde sculptarum, impressarum, coloratarumque centurias primo in hoc iconum volumine duas offerre me posse credidi Rei herbariæ amatoribus; ut habeant veluti appendicem ad Floram Hortumque, quæ opéra tanto exceperunt favore, ut nullum nunc eorum venale exemplar superfit. Inserui tamen etiam selectarum stirpium figuras plusculas, ab amicis benevole communicatas, quæ dum ornamentum huic operi non leve adferunt, spectatque ad illos omnis honor, propterea ad calcem explicatæ tabulæ nomen auctoris legitur.

Descriptiones prolixas in Miscellaneis meis adumbravi, inque Collectaneis adumbrare pergam, ut ob levius pretium plures sibi comparare illas, si mereantur, possint; hic solas icones editurus. His tamen adjeci explicationem brevem, et compendiosè synonyma selecta; usus etiam hic præter morem determinationibus sic dictis specificis, quas quidem alibi a me omissas, cum publica, tum privata admonitione, plures Botanici minime probare se testabantur. Horum igitur desiderio factum est satis. Ego autem uti eram persuasus, esse illas in omni opere methodico quam maxime

necessarias, sic in vago aliquo nullumque ordinem servante, si non superfluas, certe esse parum utiles, existimabam, dummodo descriptio accurata complecteretur omnes illas partes, ex quibus peti et concinnari qualiscunque talis determinatio posset. Absterrebat non minus fluxa harunce determinationum conditio; nec enim aptæ natæ placere omnibus, nec etiam ob novas forte detegendas congeneres plantas ex se satis firmæ, jam ad arbitrium lubitumque, jam ex necessitate, potuissent vel debuissent mutari ab aliis. Ipse ego in hoc opere exempla similibus mutationum luculenta dedi, qui nec propriis peperci antiquis determinationibus.

Systema Linnæi dum cito, intelligo editionem quartam & decimam, in qua multæ numerantur stirpes, in meo hoc opere, quod per fasciculos prodit, jam ante evulgatæ, tunc novæ. Occurrent etiam hic pauca, apud alios Botánicos jam optimis iconibus illustratæ; at vero nec illis hoc nec vitio mihi verti potest. Ferme eodem tempore illæ fuerunt vulgatæ, in fciis alterius consilii autoribus. Si damni quid inde patitur, qui eandem bis plantam empturus est; et si nominum hinc enata noxia multiplicitas inevitabilis exurgit; orietur tamen utilitas aliqua, ut comparari in perficiendis iconibus industria autorum, et dijudicari in descriptionibus scientia possit.





CONSPECTUS TABULARUM.

M O N A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

Tab.

- 1 **COSTUS ARABICUS.** *Linn. syst. Hill. hist. nat. Jacq. coll. vol. 1. Tsjana-kua. Rhed. mal.*
 Caulis superior foliosus et florescens. Caulis infimus aphyllus, adhærens tuberi radicis avulsæ. Inter utrumque pars desideratur sesquipedalis. Ad spicæ latus seorsim exhibetur Nectarii labium superius cum adnatis antheris et cum egresso ex basi ejusdem tubulosa stylo, avulso scilicet labio inferiori. Tum Corolla. Dein Nectarium integrum cum expanso labio inferiori. Tandem Germen, calyce coronatum, occultatumque utraque spatha. Idem cum sola spatha laterali angustiore. Et idem absque omni spatha. Infra ad latus conspicitur Capsula matura, calyce coronata, jamque dehiscens. Eadem seminibus delapsis vacua et contractior. Semen adhuc cohærentium compages, primum lateraliter, dein interne delineata. Semen solitarium. Siftitur etiam plantula tenella, e semine enata, vix bimestris.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- 2 **WULFENIA CARINTHIACA.** *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
 Tota planta florens. Seorsim Fructus et Corolla. *Wulfen.*
- 3 **SALVIA SEROTINA,** foliis ovatis cordatisque, crenulatis, mollibus; verticillis racemosis; bracteis minutis. *Linn. syst. Arduin. spec. 1. Jacq. coll. vol. 1.*
 Tota planta adulta cum delapsis jam ex caule calycibus fructescentibus. Flos auctus.



- 4 SALVIA VIRIDIS, foliis ovato-oblongis, crenatis; calycibus fructigeris subreflexis. *Linn. syst. Tourn. inst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta, supra florens, infra jam frutescens. Nuper etiam ramosioremi vidi.
- 5 SALVIA VISCOSA, foliis oblongis, obtusis, erose-crenatis, viscidis; floribus verticillatis; bracteis cordatis, acutis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis fere totus florens. Corolla.
- 6 SALVIA ABYSSINICA, foliis inferioribus lyratis; summis cordatis; floribus verticillatis; calycibus mucronatis, ciliatis. *Linn. syst? Linn. suppl? Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis florens, fere totus. Folium radicale. Aucta Flos, Stamen, Calyx frutescens et Semen. Sæpissime hujus plantæ femina accepi, semper sub dicto titulo. Maxime affinis est Salviæ niloticæ, foliis tamen diversa; sed in Linnæanam abyssinicæ determinationem descriptionemque minime quadrat.
- 7 SALVIA SPINOSA, foliis oblongis, repando-crenatis; bracteis cordatis, concavis, calycibusque mucronatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens primi anni. Petalum. Semen.

TRIGYNIA.

- 8 PIPER MEDIUM, foliis ovatis, rarius basi cordatis, quinquenerviis, reticulatis; spicis gracilibus. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramulus florens. Spicæ pars auctæ.
- 9 PIPER OBTUSIFOLIUM, foliis late ovatis, enerviis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Saururus humilis etc. *Plum amer.*
Planta florens. Pars spicæ auctæ.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

- 10 SCHOENUS UMBELLATUS, culmo triquetro, folioso; spicis umbellatis, *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Flosculus auctus, ex duobus lateribus oppositis conspectus.

DIGYNIA.

- 11 PASPALUM VIRGATUM, spicis pluribus, racemosis, ad ortum villosis; florum ordine quadruplici. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Gramen dactylon majus etc. *Sloan. hist. jam.*
Culmi florentis pars superior, idemque inferior cum paucis fibris radicalibus, omiſſa parte intermedia. Spica antice proposita, ut flores conspici possint. Eadem aucta, floribus avulsis inferne spoliata. Flos singularis, maxime auctus. Similiterque auctum Semen.
- 12 PANICUM COLORATUM, panicula ramosa, patentissima; calycis valvula extima acuminata; foliis sublinearibus. *Linn. syst. Linn. mant.*
Tota planta, abscissis duobus culmis. Flos auctus.
- 13 PANICUM MAXIMUM, paniculæ elongatæ ramis racemosis, patentibus; pedunculis plerisque ultra flores productis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Pars summa culmi florentis. Ejusdem pars infima cum radice. Flos auctus.
- 14 PHLEUM ASPERUM, spica cylindrica, compressa. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta. Flos auctus. Spicæ sectio transversa, ut compressio ejusdem dijudicari possit.
- 15 PHLEUM SCHOENOIDES, culmo ramoso, procumbente; spicis ovatis; vaginis foliorum patentibus. *Linn. syst. Læst. hisp. Jacq. coll. vol. 1.* Gramen maritimum typhinum Triumphetti etc. *Scheuchz. agrost.*
Planta tota florens. Flos auctus, auctumque Semen.



- 16 AGROSTIS TENACISSIMA, panicula contracta, filiformi, longissima; floribus muticis, linearibus. *Linn. syst. Linn. suppl. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. Aucta Flos et Semen.
- 17 POA ABYSSINICA, panicula patula; spiculis oblongis, circiter quinquefloris; culmo geniculato, inferne procumbente, ramofo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Pars plantæ cum pluribus culmis. Spicula aucta.
- 18 POA PERUVIANA, panicula spicata; spiculis ovatis; caulibus procumbentibus foliisque hirsutis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta. Spicula in magnitudine naturali, eademque aucta.
- 19 POA DISTICHA, spica disticha, terminali, hinc convexula, illinc plana. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Sesleria Hall. hist. num. 1447.*
Tota planta cum tribus spicis antice, unica dorso conspectis. Ad latus seorsim aucta valvula corollæ interior, dorso carinis binis ciliatis percurfa. Dein flosculus ter diversimode auctus, Tandem spica a tergo viva. *Wulfen.*
- 20 CYNOSURUS SPHÆROCEPHALUS, bracteis integris, lacero-dentatis; spicis globosis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Sesleria sphærocephala. Arduin. spec. 1.*
Tota planta, alia floribus cæruleis, alia iisdem albis. a) Spicula. c) Corolla. b) Eadem aucta. d) Pistillum auctum. *Wulfen.*
- 21 CYNOSURUS CÆRULEUS, bracteis integris, lacero-crenatis; spica oblongo-ovata. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Sesleria cærulea. Scop. carn. Arduin. spec. 1. Allion. pedem. Hall. hist. helv. num. 1446. Gramen glumis variis. Bauh. pin. et prodr. Scheuchz. agrostr.*
Tota planta. Culmus transverse sectus. a) Calyx naturalis et auctus. b) Corolla naturalis et aucta. d) Spicula. c) Eadem expansa. e) Corolla cum germine. h) Flosculus totus. f) Pistillum naturale et auctum. g) Pars infima spicæ cum Bracteis. *Wulfen.*
- 22 CYNOSURUS DOMINGENSIS, panicula ramis simplicibus; spiculis subsessilibus, subquinquefloris; flosculis omnibus aristatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Culmus florens totus cum radice. Spicula aucta.
- 23 AVENA STERILIS, paniculata, ramis plerisque unifloris; calycibus quinquefloris; exterioribus flosculis aristatis basi que pilosis, interioribus muticis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Ægiolops mauritanica. Petiv. gaz. Gramen avenaceum maximum etc. Magn. bot.*
Culmus totus florens cum radice. Spicula aucta. Semen.

T E T R A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- 24 SCABIOSA MONSPELIENSIS, corollulis quinquefidis, æqualibus, calyce brevioribus; tota hirsuta; foliis inferioribus pinnatis, summis pinnatifidis. *Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florens. Corollulæ seorsim.
- 25 RUBIA FRUTICOSA, foliis perennantibus, lineari-lanceolatis, ad oras retrorsum aculeatissimis; caule aspero. *Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis ramofo florentisque pars, in quo asperitas, tactu quidem notabilis, sed oculo nudo vix percipienda, exprimi non potuit. Fructus et Semen.
- 26 PLANTAGO MAXIMA, foliis villosulis, lanceolatis quinquenerviis, et latissime lanceolato-ovatis multinerviisque; spica cylindrica; scapo tereti. *Jacq. coll. vol. 1.*
Pars radice cum integro florente scapo. Folia varia. Tantilla villositas est, ut exprimi in figura non potuerit.



- 27 **PLANTAGO CORNUTI**, foliis pinnatis; pinnis inæqualibus et distantibus; scapo tereti; styli longissimis; filamentis brevissimis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Tota planta. Flos auctus.
- 28 **PLANTAGO ÆGYPTIACA**, caule ramoso, herbaceo, decumbente; foliis linearibus, integerrimis; capitulis longe foliosis, laxis. *Jacq. coll. vol. 1. Plantago squarrosa. Linn. syst. Kalli tertium. Alp. ægypt. Kalli ægyptiacum. Bauh. pin.*
Planta florens cum abscissis pluribus ramis.
- 29 **DIODIA VIRGINICA**. *Linn. syst. Gron. virg. Jacq. coll. vol. 1.*
Florens et jam simul fructescens tota planta. Flos auctus, in quo stamina et stigmata repræsentantur, qualia primo anno, quo in horto habui, sese obtulerunt. Subsequis autem annis filamenta alba et erecta corollam longitudine ipsam æquarunt perpetuo omnia, et stigmata patebant. Nec poterant hæc corrigi in tabula jam impressa colorataque. Dein Fructus sistitur maturus; ejusdem dimidii sectio transversa; et Semen.

P E N T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- 30 **ÉCHIUM CANDICANS**, caule arboreo; ramis villosis, albicantibus; foliis lanceolatis utriusque acutis, hirsutis, venoso-nervosis; panicula terminali, pedicellis spicatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramulus florens ex planta juniore; nam in planta nunc sexenni panicula triplo amplior longiorque est; tum etiam truncus triplo crassior, quam cujus hic frustum depingitur. Folium majus.
- 31 **TOURNEFORTIA CYMOSA**, foliis lanceolatis, integerrimis, asperiusculis, petiolatis; spicis cymosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Brown. jam. num. 2. Heliotropii flore frutex etc. Sloan. hist. jam. 2.*
Ramus florens.
- 32 **CORTUSA MATTHIOLI**. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Gmel. sib. 4. Bauh. hist. Dalech. lugd. Allion. pedem. Clus. hist. Sanicula alpina. Tabern. Caryophyllata Veronensium. Lobel.*
Planta tota. Corolla discissa et expansa. *Wulfen.*
- 33 **LISIANTHUS GLAUCIFOLIUS**, foliis oblongis, sessilibus; pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. Pistillum. Capsula. Semina.
- 34 **CONVOLVULUS FLORIDUS**, fruticosus; foliis lanceolato-linearibus; floribus paniculatis; capsula uniloculari, monosperma. *Linn. syst. Jacq. coll. 1.*
Ramus florens. Capsula calyce comprehensa. Semen. Capsula aucta, dempto calyce.
- 35 **IPOMOEA LUTEOLA**, foliis cordatis, acuminatis, subangulatis; pedunculis primum dichotomis, dein racemosis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Caulis florentis pars summa.
- 36 **IPOMOEA HEDERACEA**, foliis trilobis quinquelobisve, cordatis; pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Pedunculus fructescens. Semen.
- 37 **LONICERA TARTARICA**, pedunculis bifloris; baccis distinctis; foliis cordatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Pall. rufs. Chamæcerafus fructu gemino etc. Amm. ruth.*
Ramus florens. Semen. Fructus.
- 38 **PHYSALIS PROSTRATA**, ramosissima, diffusa, prostrata; foliis ovatis, repandis; caule ramisque teretibus, hirsutis. *Jacq. coll. vol. 1. Herit. stirp.*
Pars plantæ cum radice. Capsula fructescens. Bacca. Semina.



- 39 **PHYSALIS BARBADENSIS**, ramosissima; foliis cordatis, villosis; calycibus fructescentibus pendulis, ovatis, acutis, pentagonis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Tota planta. Bacca.
- 40 **SOLANUM CORYMBOSUM**, caule inermi, suffruticoso; foliis ovato-lanceolatis, acutis; pedunculis florentibus corymbosis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis florens. Racemulus fructescens.
- 41 **SOLANUM ACULEATISSIMUM**, caule aculeatissimo, hirsuto, suffruticoso; foliis cordatis, lobatis, dentatis, acuminatis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis pars superior.
- 42 **SOLANUM FUSCATUM**, caule aculeato, annuo, partim procumbente; foliis ovatis, lobatis sinibus lobisque obtusis; aculeis utrinque rectis, in superiore pagina coloratis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Fructus nedum perfecte maturus.
- 43 **SOLANUM COCCINEUM**, caule aculeato, fruticoso; foliis ovatis, subrepandis, uno alterove aculeo armatis, subtomentosis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis pars cum ramis florentibus et fructescentibus.
- 44 **SOLANUM STRAMONIFOLIUM**, caule aculeato, fruticoso; foliis cordatis, acute lobatis, aculeatis, subvillosis; calycibus inermibus. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens, cujus in dorso delineatur folium majus.
- 45 **SOLANUM MARGINATUM**, caule aculeato, fruticoso; foliis cordatis, lobato-repandis, junioribus margine supra albis. *Linn. syst. Murr. comment. gætt. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Fructus, idemque transverse dissectus.
- 46 **SOLANUM LYCIOIDES**, caule spinoso, fruticoso; foliis ellipticis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus cum floribus et fructu.
- 47 **CYRILLA RACEMIFLORA**. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Flos a dorso, idemque a facie conspectus, auctus.
- 48 **ELÆODENDRON ORIENTALE**. *Linn. syst. Act. helv. vol. 9.*
Ramulus florens. Idem ex eadem arbore juniore, nedum florente. Pedunculus florens auctus. Drupa. Nux. Drupa transversim secta. Jam ante aliquot annos filius meus novæ hujus stirpis descriptionem cum Societate Helvetica physico-medica communicaverat, nono Actorum ejusdem volumini, uti ferebatur, brevi edendo, inferendam; quod tamen nedum vulgatum novi.
- 49 **RIBES PETRÆUM**, inerme; racemis florentibus erectis, fructescentibus pendulis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens. Idem fructescens. Corolla discissa et expansa. Pistillum. *Wulfen.*
- 50 **VITIS VINIFERA**, foliis lobatis, sinuatis, nudis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Sylvestris austriacæ plantæ ramus florens, idemque fructescens.
- 51 **CELOSIA PROCUMBENS**, caulibus decumbentibus, hirsutis; foliis longe lanceolatis; pedunculis longissimis, aphyllis; pedicellis spicatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Murr. comm. gætt. Gomphrena interrupta. Linn. syst. Herit. stirp.*
Planta cum uno caule, abscissis reliquis. Flos auctus. Illustris L'Heritier Gomphrenam Linnæi interruptam fide Linnæi filii asserit; sed nemo hanc plantam Celosias inter Linnæanas, et caule quidem erecto donatas, quævisisset. Etiam in caldariis nostris sæpe radix perennat.
- 52 **NERIUM CORONARIUM**, foliis lanceolatis; caule dichotomo; pedunculis unifloris, ex ramorum dichotomia geminis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Pedunculus avulso calyce Pistillum efferens. Pars dissecti longitudinaliter tubi corollæ cum tribus superstitibus staminibus.



- 53 ECHITES DOMINGENSIS, pedunculis subtrifloris; foliis ovato-oblongis, scabriusculis. caule volubili. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens, pendulus.

DIGYNIA.

- 54 CYNANCHUM EXTENSUM, caule volubili, herbaceo; foliis reniformi-cordatis, acutis; petalis hirsutis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Pars caulis florigeri. Aucta Nectarii compages cum inclusis genitalibus. Magis auctum Pistillum cum adhærentibus nectarii squamis saccatis.
- 55 ERYNGIUM ALPINUM, foliis inferioribus cordatis, superioribus partitis; capitulis oblongis; involucri polyphylli foliolis ferrato-spinosis; paleis fetaceis, trifidis. *Linn. syst. Scop. carn. Allion. pedem. Tourn. inst. Bauh. hist. et pin. Hall. hist. helv. num. 736.*
Caulis florens. Semen. Idem transverse sectum auctumque.
- 56 BUPLEURUM PETRÆUM, scapo simplicissimo, involucellis polyphyllis, universali pentaphyllo; foliis radicalibus lanceolato-linearibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Ger. galloprov. Hall. hist. helv. num. 773. Bupleurum alpinum foliis angustis etc. Seg. veron. vol. 2. Sedum petræum etc. Pon. apud cluf. Perfoliata alpina angustifolia minor. Bauh. pin. Pluk phytogr. Planta tota florens. Flos intus conspectus. Idem a latere. Fructus. Wulfen.*
- 57 ATHAMANTA MATTHIOLI, foliis supradecompositis; foliolis subfetaceis, glabris; radice perenni. *Jacq. coll. vol. 1. Libanotis rupestris. Scop. carn. Meum athamanticum. Matthil. in Diosc. Meum Matthioli. Dalech.*
Tota planta foliis radicalibus caulibusque paucis abscissis. Flos auctus. Umbella expansa. *Wulfen.*
- 137 58 LASERPITIUM ARCHANGELICA, foliolis ovatis, ferratis, subtus hirsutis, integris vel bipartitis; extimis tripartitis. *Jacq. coll. vol. 1. Laserpitium chironium. Scop. carn. Archangelica. Cluf. Dodon. Dalechamp. Bauh. hist. Tabern.*
Caulis florens pars superior. Radix cum caulis parte infima et folio radicali truncato. Fructus. Corolla. *Wulfen.*

TRIGYNIA.

- 59 SAMBUCUS RACEMOSA, racemis compositis, ovatis; caule arboreo. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Bauh. pin. Bauh. hist. Allion. pedem. Lob. ic. Hall. hist. num. 672.*
Ramulus florens. Idem fructescens. Flos auctus. Semina.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

- 60 BROMELIA HUMILIS, foliis patentibus, rigidis; floribus aggregatis, sessilibus; axillis stoloniferis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Planta tota, longitudinaliter dissecta. Fructus maturus. Spatha intus spectata. Spatha cum flore. Germinis pars summa cum stylo. Corollæ foliolum cum suis staminibus.
- 61 LACHENALIA TRICOLOR. *Linn. syst. Act. helv. vol. 9.*
Tota planta florens.



- 62 ALIUM RAMOSUM, *Linnæi?* an vero ALLIUM OBLIQUUM ejusdem! an tandem nova species? Utraque determinatio Linnæana in hoc quadrat; at neutra convenit Gmelini figura. Hinc dubius hæreo. *Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florentis pars superior, et inferior cum radice. Flos seorsim.
- 63 ALBUCA ALTISSIMA, petalis interioribus apice glandulosis et inflexis; foliis canaliculato-convolutis et sic subulatis. *Act. suec. nov. vol. 5. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens. Pistillum auctum. Capfula. Semen. Flos avulsis petalis exterioribus. Petalum interius. Genitalia avulsis omnibus petalis, quando filamenta tria fertilia elastice patent, sterilia erecta perstant. Stamen sterile. Pistillum in magnitudine naturali.
- 64 ALBUCA ABYSSINICA, petalis apice fornicatis; foliis glabris; bracteis flore longioribus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Act. suec. nov. vol. 5.*
Tota planta florens. Pistillum. Genitalia avulsis petalis. Squama cum filamentis.
- 65 SCILLA HYACINTHOIDES, racemo laxo; corollis femicampanulatis. *Jacq. coll. vol. 1.* non *Linn. syst.*
Tota planta florens. Pistillum. Capfula. Semen. Æque Hyacinthus quam Scilla vocari potest, utroque modo nova species; ab illo diversa poro nullo nectarifero in germine et corolla vere hexapetala; ab hac vero corolla ad medietatem usque campanulata.
- 66 HYACINTHUS VIRIDIS, corollarum exterioribus laciniis subulatis, longissimis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Murr. comm. götting.*
Tota planta florens.

TRIGYNIA.

- 67 RUMEX GLAUCUS, floribus hermaphroditis; valvulus nudis; foliis cordato-hastatis; caule suffruticoso. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens et fructescens in primo ætatis anno. In subsequis ramosissima evadit, caulibus etiam procumbentibus. Nimium affinis Rumici scutato.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

- 68 STELLERA PASSERINA, foliis lineari-lanceolatis; corollis quadrifidis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Allion. pedem. Passerina. Bauh. hist. Linaria altera botroides. Col. ephr. Lithospermum linariæ folio. Bauh. pin.*
Tota planta cum floribus et fructibus. Semen auctum. Idem in magnitudine naturali. Flos auctus.

TETRAGYNIA.

- 69 HALORAGIS ALATA, fructu quadrialato. *Jacq. miscell. vol. 2. Forster. flor. Tetragonia ivæfolia. Linn. syst. Cercodia erecta. Murr. comm. gött.*
Caulis pars superior. Tum quæ sequuntur, omnia ad microscopium maxime aucta. Flos. Pistillum cum calyce. Fructus bis. Idem transverse sectus. Nux.



DECANDRIA. MONOGYNIA.

- 70 CASSIA SENNOIDES, foliis trijugis; foliolis obverse ovatis; glandula obtusa inter infima; stipulis subulatis; caule arboreo. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Folium expansum.
- 71 CASSIA RUSCIFOLIA, foliis sejugis; foliolis lanceolatis, acutis, glabris; glandula supra basin costæ; pedunculis multifloris. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens, Legumen. Semen.
- 72 CASSIA MULTIGLANDULOSA, foliis sejugis; foliolis obtusis, subtus et ad oras villosis; glandula inter omnia foliolorum paria. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Legumen. Semen.
- 73 CASSIA CHINENSIS, foliis pinnatis ex quatuor ad septem paribus; foliolis lanceolatis; glandula supra basin costæ; legumine transverse costato. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Folium ex caulinis majoribus. Legumina. Semen.
- 74 CASSIA CRISTA, foliis pinnatis ex septem ad novem paribus; foliolis oblongis, obtusis; glandula terete et obtusa inter infima. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens.
- 75 SCHOTIA SPECIOSA. *Jacq. coll. vol. 1.* Theodora speciosa. *Medic.* Guajacum afrum. *Linn. syst.* Acacia africana etc. *Walt. hort.* Arbor afra, acaciæ similis, etc. *Boerh. ind.*
Ramus florens. Flos. Idem præter naturam expansus, ut genitalia appareant. Pistillum cum calycis tubo, longitudinaliter secto.
- 76 RUTA LEGITIMA, foliolis linearibus, acutis; petalis erectis, imberbibus. *Allion. pedem. Jacq. coll. vol. 1.* Ruta montana. *Clus. hist.*
Caulis fere totus, florens.
- 77 DAIS LAURIFOLIA, floribus decandris; foliis lanceolatis, acutis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Trunci pars cum ramulis florentibus. Pars corollæ longitudinaliter dissectæ Flos. Germen cum parte styli auctum.
- 78 RHODODENDRON PONTICUM, foliis nitidis, lanceolatis, utrinque glabris; racemo umbellato, terminali. *Linn. syst. Tourn. it. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. An diversa species a Rhododendro pontico. *Pall. flor. ruff. pag. 43. tab. 29?*
- 79 ANDROMEDA LUCIDA, racemis secundis, nudis, patentissimis; corollis subcylindricis; foliis integerrimis, lucidis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens.

DIGYNIA.

- 80 SAXIFRAGA STOLONIFERA, foliis subrotundis, basi cordatis, crenatis; sarmentis axillaribus; corollis inæqualibus. *Jacq. miscell. vol. 2. Act. upf. nov. vol. 3.* Saxifraga sarmentosa. *Linn. syst. Thun. japon.* Saxifraga ligulata. *Marr. comm. gætt. Sekika. Kämpf. amæn.*
Tota planta florens, radice excepta.
- 81 SAXIFRAGA PETRÆA, foliis palmato-tripartitis, laciniis subtrifidis; caulibus ascendentibus, ramosissimis, laxis; pedunculis elongatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Pon. apud Clus. Seg. ver.* Saxifraga aizoides alpina etc. *Plukn. alm.*
Planta integra florens. Alia superius posita, foliis plerisque integris, varietas prioris. *Wulfen.*
- 82 DIANTHUS SYLVESTRIS, caulibus subunifloris; squamis calycinis suboratis, brevissimis; corollis acute multicrenatis; foliis subulatis, supra sulcatis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Minus specimen repræsentat plantam florentem communiore habitu. Majus ejusdem varietatem minus frequentem. *Wulfen.*



TRIGYNIA.

- 83 ARENARIA BIFLORA, foliis obverse ovatis, obtusis, basi ciliatis; caulibus procumbentibus, ramosissimis; pedunculis lateralibus, subbifloris; petalis calyce longioribus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Alfine. Hall. hist. helv. num. 877.*
Tota planta florens; minus et majus specimen. *Wulfen.*

PENTAGYNIA.

- 84 LYCHNIS GRANDIFLORA, floribus axillaribus terminalibusque, folitariis; petalis inæqualiter crenatis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens.

DODECANDRIA.

TRIGYNIA.

- 85 EUPHORBIA CLAVA, inermis, fruticosa; foliis spathulato-linearibus; pedunculis axillaribus, unifloris, bracteatis. *Jacq. coll. vol. 1. Tithymalus aizoides africanus, etc. Commel. rar.*
Tota planta florens. Flos auctus. Capsula. Semen.
- 86 EUPHORBIA LINIFOLIA, fruticosa, inermis; foliis sparsis, lanceolatis, mucrone innocuo terminatis; terminalibus ternis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens et fructescens. Flos auctus.
- 87 EUPHORBIA DIVARICATA, umbella trifida vel quadrifida; caule fruticoso, trichotomo. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Flos auctus.
- 88 EUPHORBIA DIFFUSA, umbella quadrifida vel quinquefida, dichotoma; caule diffusissimo; foliis cuneiformibus, integerrimis, alternis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Planta florens junior. Ejusdem adultæ ramulus. Flos auctus. Semen auctum.
- 89 EUPHORBIA CHARACIAS, umbella multifida, bifida; involucellis perfoliatis, emarginatis; foliis integerrimis; caule frutescente. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Allion. pedem. Clus. hist. Bauh. pin.*
Caulis pars summa, florere incipientis, cum meris floribus sterilibus. Ad latus umbellula jam bifida cum floribus fertilibus. Flos sterilis auctus.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

- 90 PRUNUS CHAMÆCERASUS, pedunculis ab unico ad quinque, umbellis sessilibus; foliis lanceolatis, utrinque glaberrimis. *Jacq. coll. vol. 1. Clus. hist. Cerasus pumila. Bauh. pin. an Prunus fruticosa. Pall. rufs? Obsat florum fructuumque color, tum horum magnitudo.*
Ramus florens. Ramulus cum fructibus maturis. Nux.

POLYGYNIA.

- 91 POTENTILLA OPACA, foliis radicalibus septenatis et novenis; foliolis oblongis, incisoferratis, pilosis; caulibus filiformibus, pilosis, decumbentibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Pentaphyllum etc. Bauh. hist. Ger. emac. Quinquefolii quarti secunda species. Clus. hist. Quinquefolium minus, etc. Bauh. pin.*
Tota planta florens cum pluribus abscissis caulibus foliisque.



- 92 **POTENTILLA ASTRACANICA**, foliis radicalibus et caulinis infimis quinatis; caulibus dichotomis, villosis, basi procumbentibus. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florens.
- 93 **GEUM ALEPPICUM**, floribus erectis; fructibus oblongis, hirsutis; aristis uncinatis, nudis; foliis pinnatis cauleque hirsutis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Pars maxima caulis. Folium caulinum infimum. Folium radicale.
- 94 **GEUM HYBRIDUM**, flore nutante; calyce folioso, corollam polypetalam excedente. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.* Caryophyllata montana tertia. *Clus. hist.*
Tota planta florens. Petalum. Flos a tergo visus. *Wulfen.*

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- 95 **CISTUS CRETENSIS**, arborescens, exstipulatus; foliis spathulato-lanceolatis, subpetiolatis, enerviis, scabris; calycinis foliolis lanceolatis, subæqualibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* *Tourn. it. Buxb. cent. Bauh. pin. Ladanum creticum. Alp. exot. Alp. hist. ægypt.*
Ramus florens.
- 96 **CISTUS SYRIACUS**, suffruticosus, exstipulatus, erectus; foliis lanceolatis, ad oras revolutis; floribus racemosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens.
- 97 **CISTUS CANARIENSIS**, suffruticosus, stipulatus, procumbens; foliis subovatis, alternis et oppositis; racemis erectis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Tota planta florens. Fructus.
- 98 **CISTUS FOETIDUS**, suffruticosus, stipulatus, procumbens; stipulis lanceolatis; foliis oblongis, hirsutis, scabris. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens. Capsula.
- 99 **CISTUS MUTABILIS**, suffruticosus, stipulatus, procumbens; stipulis lanceolatis; foliis oblongis, glabris, planis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens cum parte caulis. Varietas floribus rubris.

D I G Y N I A.

- 100 **FOTHERGILLA GARDENI** *Jacq. coll. vol. 1.* Fothergilla alnifolia. *Linn. syst.*
Ramus florens. Flos auctus. Genitalia aucta. Pistillum auctum.

T R I G Y N I A.

- 101 **DELPHINIUM URCEOLATUM**, nectariis diphyllis; labellis bifidis, apice barbatis; foliis palmatis, urceolatis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis superior pars florentis prima vice; nam subsequis annis racemus evadit quadruplo longior, et ex alis foliorum superiorum etiam racemi breviores egrediuntur. Capsula. Semen.

P E N T A G Y N I A.

- 102 **AQUILEGIA VIRIDIFLORA**, nectariis rectis, staminibusque, petali lanceolati longitudine. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Murr. comm. goett.*
Planta florens. Capsula.



POLYGYNIA.

- 103 ANEMONE FRAGIFERA, pedunculo nudo; feminibus subrotundis, lanatis, muticis; foliorum laciniis acutis, lanceolatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Anemone etc. Hall. hist. helv. num. 1151. Anemone alpina alba minor. Bauh. pin. et prodr.*
Tota planta florens. *Wulfen.*
- 104 CLEMATIS ANGUSTIFOLIA, erecta; foliis pinnatis, recurvis; foliolis lineari-lanceolatis; floribus polypetalis. *Jacq. coll. vol. 1. Clematis hexapetala. Pall. it.*
Caulis florentis pars superior. Fructus.
- 105 RANUNCULUS CANADENSIS, foliis ternatis, trifidis, incis, subtus pilosis; caule erecto; calycibus reflexis. *Jacq. miscell. vol. 2. Ranunculus pensylvanicus. Linn. syst.*
Caulis florens et fructescens. Semen.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

- 106 LAVANDULA PINNATA, foliis petiolatis, pinnatis; foliolis cuneiformibus; spicis imbricatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Linn. diff. de Lavand.*
Ramus florens.
- 107 STACHYS LANATA, verticillis multifloris; foliis lanatis; caulibus basi procumbentibus et radicantibus *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florens.
- 108 STACHYS CANARIENSIS, verticillis sexfloris; foliis cordatis, villosis, crenatis; caulibus suberectis; calycibus fructescentibus campanulato-patentissimis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis florens.
- 109 MARRUBIUM ASTRACANICUM, foliis ovatis, crenatis, tomentosis, rugosissimis; dentibus calycinis subulatis; laciniis corollæ superioribus acutis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florens.
- 110 PHLOMIS CARIBÆA, foliis ovato-lanceolatis, villosis; verticillis subrotundis, densissimis; involucris fetaceis, hirsutis; caule herbaceo. *Jacq. coll. vol. 1. Clinopodium martinicense. Jacq. hist. amer.*
Caulis florens. Radix. Flos auctus.
- 111 PHLOMIS ZEYLANICA, foliis lanceolatis, subferratis vel integerrimis; verticillis subterminalibus; calycibus obsolete dentatis. *Linn. syst. Clinopodium hyssopi latioribus foliis maderaspatanum. Plukn. phyt. Herba admirationis. Rumph. amb.*
Tota planta florens. Citavi in tabula volumen tertium Miscellaneorum; at omisi hic descriptionem, utpote superfluum post editam illam, quæ legitur nunc in systemate Linnæi.
- 112 DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM, floribus spicatis; foliis bracteisque linearibus, partitis, mucronatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Hyssopus austriacus. Herm. lugd. Ruyschiana. Boerh. lugd. Amm. ruth. Chamæpitys austriaca. Clus. hist. Besl. exst. Bauh. pin. Riv. monop. Plukn. alm.*
Planta tota florens ex sylvestribus majoribus. Stamina. Calyx utrinque conspectus. Anthera aucta. Semen.
- 113 HYPTIS VERTICILLATA, floribus verticillatis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Pars trunci. Flos auctus. Calyx auctus.
- 114 HYPTIS CAPITATA, floribus capitatis. *Jacq. coll. vol. 1. Melissa altissima globularia. Plum. ic.*
Ramus florens. Pars trunci. Corolla cum genitalibus aucta. Calyx auctus.



ANGIOSPERMIA.

- 115 PEDICULARIS ROSEA, caule simplici; foliis pinnatis; pinnis acute incis; calycibus hirsutis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
 Planta tota florens. *Wulfen.* Allionii pedicularis flor. pedem. num. 227. videtur mihi ex determinatione non minus quam ex figura omnino esse hæc mea. In Pediculari hirsuta Linnæi, cujus plura specimina egregius Heinke mihi ex Bohemia attulit, observo pinnarum lacinias obtusissimas. Pedicularis Ammanni ruth. num. 41, quæ etiam cum prioribus confunditur, differt manifeste foliis omnino bipinnatis cum pinnulis præterea incis ipsis, tum etiam caule toto costisque valde lanuginosis, quam pro nova specie habeo.
- 116 ANTIRRHINUM VERSICOLOR, foliis lineari-lanceolatis; inferioribus ternis; caule erecto, spicato. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
 Tota planta florens. Capsula aucta.
- 117 ANTIRRHINUM HIRTUM, foliolis lanceolatis, hirtulis, alternis; floribus spicatis; foliolo calycino supremo maximo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
 Tota planta florens. Capsula.
- 118 CITHAREXYLUM VILLOSUM, foliis villosis. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Ramus florens propendulus. Flos auctus.
- 119 RUELLIA PATULA, fruticosa, villosa, viscosa; foliis ovatis, integerrimis; floribus axillaribus, aggregatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
 Caulis pars summa florentis, et fructibus immaturis onusti. Capsula. Semen.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

- 120 MYAGRUM ARBORESCENS, caule arborecente. *Jacq. coll. vol. 1.* Crambe fruticosa. *Linn. syst.*
 Pars media trunci cum ramo laterali florente; quum ramus florens ex summitate ob extensionem comprehendi in hac charta non potuisset, tunc enim tota hæc panicula ramum dumtaxat partialem paniculæ universalis facit. Racemulus fructescens. Folia varietas incisi.
- 121 THLASPI ALLIACEUM, filiculis obverse cordato-ovatis, ventricosis; foliis radicalibus spathulatis, longe petiolatis; caulinis hastatis, sessilibus *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Allion. pedem. Moris. hist. Scorodo-Thlaspi. Bauh. hist.*
 Tota planta. Folia radicalia.

SILIUOSA.

- 122 SISYMBRIUM MOLLE, filiquis declinatis, brevibus, subcylindricis; foliis mollibus, denticulatis; caulinis hastatis, oblongis. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Tota planta cum flore et fructu, caulibus tamen pluribus abscissis.
- 123 SISYMBRIUM PANNONICUM, foliis caulinis superioribus glabris, pinnatis; pinnis linearibus, integerrimis; extima elongata. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Planta tota.
- 124 SISYMBRIUM HISPANICUM, filiquis cylindricis, breviusculis, erectis; foliis lanceolatis, ferratis, sessilibus. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Caulis pars magna. Racemus fructescens.
- 165 X 125 ARABIS OVIRENSIS, foliis radicalibus orbiculatis; caulinis subovatis, petiolatis, repando-dentatis; radice repente. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Planta tota. *Wulfen.*



- 126 **TURRITIS HIRSUTA**, foliis omnibus hispidis; caulinis amplexantibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Eryfimo similis hirsuta etc. *Bauh. pin. et prodr.*
Tota planta. Racemus fructescens.
- 127 **SINAPIS MILLEFOLIA**, foliis bipinnatis, pinnulis ovatis; ferratis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta biennis. Nunc sexennis triplo altior est, ramosior, et trunco lignoso calamumque crasso.
- 128 **CRAMBE ORIENTALIS**, foliis subtus ad nervos scabris; caule basi scabro, caeterum glaberrimo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.* Rapistrum orientale, acanthi folio. *Tourn. cor.*
Ramus florens. A dorso folium radicale.
- 129 **CRAMBE TATARIA**, foliis decomposito-multifidis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.* Tataria ungarica. *Clus. hist. Bauh. hist. Cachrys ungarica. Tourn. inst.*
Ramus florens. Racemus fructescens. Semen. A dorso pars folii radicalis. Folium radicale aliud, cujusmodi saepe primum prodire solet. Radicis transverse discissae pars summa. Radix eadem tota, sed multoties imminuta.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

- 130 **WALTHERIA INDICA**, foliis ovatis, ferratis, tomentosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.* Betonica arborefcens, etc. *Plukn. mant. Malvinda ulmifolia etc. Burm. zeyl.*
Ramus florens. Alius fructescens cum foliis minoribus. Semen. Capsula. Petalum. Calyx auctus. Semen auctum. Fere mihi persuadeor, Waltheriam indicam et americanam Linnæi esse unam eandemque plantam. Capitula modo sessilia, modo pedunculata sunt. Breynii tabula 57 huc non pertinere videtur, sed proponere potius Malvam spicatum Linnæi.

POLYANDRIA.

- 131 **GERANIUM GLUTINOSUM**, calycibus monophyllis; foliis trilobis cum lobo medio majore trilobato, acutis, inæqualiter ferratis, glutinosis, facie lucidis, subtus scabris; caule fruticoso. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens.
- 132 **GERANIUM TETRAGONUM**, caule fruticoso, tetragono, scandente; foliis quinquelobis, facie et ad oras pilosis; pedunculis bifloris; corollis tetrapetalis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Scop. insubr.*
Ramus florens.
- 133 **GERANIUM REVOLUTUM**, pedunculis subbifloris; foliis multifidis, linearibus, scabris, ad oras revolutis; caule arboreo. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus major florens. Caulis pars infima. Semen.
- 134 **GERANIUM MACRORRHIZUM**, pedunculis bifloris vel umbellatis; calycibus inflatis; petalis integris; pistillo longissimo. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Geranium alpinum etc. *Pon. apud Clus. Geranium batrachioides longius radicatam. Bauh. hist. Lob. obs. Dod. pempt. Dalech. lugd. Seg. ver.*
Tota planta. Umbella. Calyx. Flos post decidua petala et antheras. Fructus. *Wulfen.*



POLYANDRIA.

- 135 SIDA CARPINIFOLIA, foliis bifariis, ovato-lanceolatis, ferratis; ramis junioribus compressis, hirsutis; pedunculis axillaribus, subumbellatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Fructus totus in calyce. Capsula una. Semen.
- 136 SIDA ATROSANGUINEA, foliis cordato-ovatis, acutis, ferratis, utrinque villosis; pedunculis unifloris, solitariis, capillaribus; caule fruticoso. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramulus florens. Fructus auctus. Idem in statu naturali, calyce comprehensus. Folium subrotundo-cordatum, qualia in caule nonnunquam observavi.
- 137 SIDA MAURITIANA, foliis cordatis, acutis, holosericeis, indivisis; pedunculis petiolo longioribus; capsulis multilocularibus, hirsutis; caule arboreo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens et fructescens. Semen. Capsula una.
- 138 ALTHÆA NARBONENSIS, foliis utrinque tomentosis, inferioribus quinquelobis; superioribus trilobis; pedunculis solitariis, unifloris. *Jacq. coll. vol. 2. Pourr. flor. narb.*
Caulis florens.
- 139 MALVA SCOPARIA, foliis ovatis, acutis; floribus subglomeratis; arillis submuticis; ramis scabris. *Jacq. coll. vol. 1. Herit. stirp.*
Caulis pars summa. Arillus. Idem auctus. Seta utrinque duplicata aucta.
- 140 MALVA BALSAMICA, foliis subcordatis, sublobatis, inæqualiter ferratis, glutinosis; caule fruticoso. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens.
- 141 HIBISCUS PRÆMORSUS, foliis subrotundis, præmorsis, crenatis; calycibus tomentosis; caule fruticoso. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Semen. Fructus.
- 142 HIBISCUS VIRGINICUS, foliis acuminatis, ferratis; inferioribus cordatis; superioribus hastato-lobatis; racemis terminalibus; floribus nutantibus; pistillis cernuis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Gron. virg.*
Pars summa caulis florentis in primo ætatis anno. In subsequis totus hic caulis ramo tantum similis est, sic ut tunc planta evadat supra medium ex ramis paniculata, numerosissimisque floribus valde speciosa. Folium inferius. Radix. Semen.
- 143 HIBISCUS PENTACARPOS, foliis acutis, ferratis; inferioribus cordatis; superioribus subhastato-lobatis; pedunculis axillaribus, unifloris; floribus nutantibus; pistillis cernuis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Ketmia palustris etc. Michel. pis. Tozz. it. Zannich. ven.*
Caulis florentis et fructescens pars superior. Semen.

DIADELPHIA.

DECANDRIA.

- 144 CROTALARIA COERULEA, foliis simplicibus; ovatis, basi attenuatis, sessilibus, subretusis; stipulis falcatis, amplexantibus caulem; caule tetragono. *Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis florens. Racemus fructescens. Semen. An forte Crotalaria verrucosa Linnæi? Sed nihil verrucosi in tota planta est.
- 145 DOLICHOS SOJA, caule suberecto, flexuoso, hirsuto; racemis axillaribus, brevissimis, vel floribus aggregatis, erectis; leguminibus hirsutis; pendulis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Phaseolus erectus, filiquis lupini, etc. *Kæmpf. amœn.*
Caulis florentis pars summa. Legumen. Semen.



- 146 GLYCINE CARIBÆA, foliis ternatis, subvillosis; foliolis rhombeis; racemis patulis; leguminibus hirsutis; caule fruticoso, volubili. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens pendulus. Caulis lignosi pars. Legumen. Semen. Calyx. Ala. Carina. Vexilli inversi unguis auctus.
- 147 CYTISUS TENER, foliis simplicibus, lanceolatis; ramis teretibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus princeps. Legumina. Semen.
- 148 ROBINIA VESICARIA, racemis axillaribus; foliis abrupte pinnatis. *Jacq. coll. voll. 1.*
Ramus florens. Planta junior cum cotyledonibus et primo folio caulino simplici. Legumen cum valvulis patulis, ut interior duplicatura cum feminibus contentis spectetur. Legumina integra. Semen. Vexillum. Ala. Carina. Genitalia.
- 149 HIPPOCREPIS BALEARICA, leguminibus pedunculatis, confertis, arcuatis, margine exterioriore repandis, lanceolatis; caule suffruticoso. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Tota planta florens, abscissis paucis caulibus. Legumina. Semen. Vere diversa est ab Hippocrepide comosa, faltem nostrate; quæ folia habet lanceolata potius, radicem perennem quidem, sed caules vix suffruticosos, legumina autem angustissima et linearia, femina minus curva. Balearicæ folia sunt multo angustiora, oblonga et sempervirentia; caules vere suffruticosi, lignosi, nunc jam digitum minimum crassi et subpedales; toti quanti una cum omnibus ramulis tenerioribus semper foliosis virentibusque sæpe in hybernaculo persistentes per totam hyemem; legumina tandem lata et fere lanceolata.
- 150 GALEGA OCHROLEUCA, leguminibus racemosis, glabris, pendulis; foliis trijugis; foliolis subovatis, obtusis; caule fruticoso. *Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens. Racemus fructescens. Semina.
- 151 PHACA ALPINA, caulescens, erecta, villosa; foliis pinnatis, foliolis ovalibus; stipulis lanceolatis; leguminibus cymbæformibus. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Gmel. sibir. vol. 4. Tab. 14. Astragalus. Hall. hist. helv. num. 401. Astragaloides. Amm. ruth. num. 148.*
Caulis pars superior. Pars radice. Vexillum. Ad hujus utrumque latus Alæ. Carina. Calyx cum genitalibus. *Wulfen.* Ex hujus plantæ figura et descriptione evidenter patet, quantopere ab hac differat Phaca frigida mea Flor. austr. tab. 166., quas Linnæus vult esse easdem. Frigida determinari potest: Phaca caulescens, erecta; foliis pinnatis, foliolis ovatis; stipulis ovatis, magnis; leguminibus cymbæformibus.
- 152 ASTRAGALUS ASPER, caulescens, strictus, subasper; floribus spicatis in pedunculis elongatis erectis; leguminibus oblongis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florentis pars superior. Flos. Legumen. Semen.
- 153 ASTRAGALUS HIANs, caulescens, ascendens, villosus; leguminibus oblongis, hamatis, hirsutis, altera futura antice hiantibus. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. Flos auctus. Racemus fructescens. Legumen auctum.
- 154 ASTRAGALUS LEONTINUS, caulescens, procumbens; leguminibus ovatis, villosis; floribus spicatis, erectis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Radix cum uno caule florenti. Vexillum. Alæ. Carina. Calyx cum genitalibus. *Wulfen.*
- 155 ASTRAGALUS URALENSIS, acaulis, hirsutus; scapis erectis, folia tandem superantibus; leguminibus subulatis, inflatis, villosis, erectis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Hall. hist. helv. num. 410.*
Tota planta florens et fructescens. Carina. Vexillum. Ala. *Wulfen.*
- 156 MEDICAGO CARSTIENSIS, caule erecto; radice perenni, reptante; floribus umbellatis; leguminibus cochleatis, fetosis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. Legumen. Idem vi diductum in spiram. Semen.



SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

- 157 TRAGOPOGON MUTABILIS, calycibus octophyllis, radium corollæ æquantibus; foliis integris, strictis, lanceolato-acuminatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens. Folium caulinum ex infimis. Flos a tergo visus. Semen cum pappo. Flores alii duo, colore variantes.
- 158 TRAGOPOGON UNDULATUS, calycibus radium corollæ æquantibus; foliis integris, sublinearibus; caulinis undulatissimis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florentis pars summa. Folium ex infimis. Flos a tergo conspectus. Semen cum pappo.
- 159 TRAGOPOGON PORRIFOLIUS, calycibus corollæ planissimæ radio longioribus; corollulis angustissimis, truncatis; pedunculis superne incrassatis; caule stricto. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Flor. dan. Tragopogon purpureocæruleus. Bauh. pin. Moris. hist. Barba hirci altera. Camer epit. Dalech. lugd.*
Summa pars caulis florifera. Calyx fructescens. Semen cum pappo.
- 160 SCORZONERA TARAXACIFOLIA, foliis runcinatis, in petiolum decurrentibus; scapo ramofo, aphylo. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Radix cum uno caule paucisque foliis. Semen cum pappo.
- 161 SONCHUS FRUTICOSUS, caule fruticoso. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Caulis florentis pars summa. Semen.
- 162 LACTUCA INTUBACEA, foliis runcinatis, dentato-ciliatis, obtusis, amplexicaulibus; caule paniculato. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta.
- 180 163 HIERACIUM SAXATILE, caule ramofo, folioso; foliis anguste lanceolatis, utrinque acuminatis, dentatis, basi pilosis; caule ramofo, folioso. *Jacq. coll. vol. 1. Id. observ. part. 2.*
Tota planta florens ex minoribus.
- 164 CRËPIS ALBIDA, hirtula pilis brevissimis capitatis; foliis radicalibus longe spathulatis, dentatis vel runcinato-incis; caulinis subamplexicaulibus; calycibus exterioribus subciliatis, ovatis, acutis. *Jacq. coll. vol. 1. Allion. pedem.*
Pars caulis superior. Folia duo radicalia. Squama calycis exterior. Semen.
- 165 HYPOCHÆRIS HELVETICA, caule simplici, folioso, unifloro; foliis lanceolatis, dentatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Allion. pedem. Hall. hist. helv. num. 2. Hieracium montanum, foliis dentatis, flore magno. Bauh. pin. et prodr. Hieracium incanum tomentosum integro folio. Barrel. ic. Boccon. mus.*
Tota planta. Squama calycina. *Wulfen.*
- 166 CARDUUS ARABICUS, foliis decurrentibus, pinnatifidis, lanuginoso-villosis; laciniis divaricatis; calycibus oblongis, spinulosis, sessilibus, aggregatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens.
- 167 ONOPORDON ACAULE, caule vix ullo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Vaill. act. Hall. gætt.*
Tota planta. Semen cum pappo.
- 168 CACALIA LACINIATA, caule fruticoso; foliis carnosis, pinnatifide laciniatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens.



- 169 EUPATORIUM SCANDENS, caule volubili; foliis cordatis, acutis, dentatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Conyza scandens. *Plum. ic.* Clematidis novum genus, etc. *Plukn. alm.*
Ramus pendulus florens. Semen auctum. Flosculus auctus. Calyx communis auctus.
- 170 EUPATORIUM SYRIACUM, foliis oppositis, subsessilibus, ternatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Caulis florentis pars superior.
- 171 CHRYSOCOMA DICHOTOMA, fruticosa, prolifera, dichotoma, glabra; foliis linearibus, planis, scabriusculis; pedunculis corymbosis, squamosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Truncus cum radice et uno caule florente.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

- 172 ARTEMISIA HISPANICA, foliis pinnatis, utrinque glabris; pinnis pinnatifidis; pinnulis incisif; floribus subgemellis, axillaribus, globosis, erectis. *Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta minor. Folium caulinum ex planta majore quinquepedali. Inter Artemisias erectas herbaceas pertinet.
- 173 XERANTHEMUM FULGIDUM, foliis lato-lanceolatis, convoluto-incumbentibus, floribus corymbosis. *Linn. syst. Linn. suppl.*
Caulis florens. Caulis pars inferior.
- 174 SENEIO GRAMINIFOLIUS, corollis nudis; foliis linearibus, sparsis, recurvis; caule frutescente. *Jacq. miscell. vol. 2.* Senecio reclinatus. *Linn. syst. Herit. stirp.*
Caulis florentis pars superior.
- 175 VERBESINA GIGANTEA, foliis alternis, profunde pinnatifidis; caule fruticoso. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.* Bidens frutescens. *Plum. ic.*
Caulis florere incipientis pars superior. Trunci pars intermedii. Flos auctus. Flosculus auctus. Palea aucta.

POLYGAMIA FRUSTRANA.

- 176 SCLEROCARPUS AFRICANUS. *Linn. syst. Act. helv. vol. 9.*
Pars caulis florentis.
- 177 ZOEGEA ALEPPICA, foliis pinnatis. *Jacq. coll. vol. 1.* Zœgea Leptaurea. *Herit. stirp.*
Tota planta. Flosculus disci. Corollula radii, a tergo visa. Calycis squama interior. Alia exterior. Eademque aucta.
- 178 CENTAUREA VERUTUM, calycibus simplicissime spinosis, cum dentibus paucissimis suboppositis; foliis decurrentibus, lanceolato-oblongis, subintegris. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramus florens.


POLYGAMIA NECESSARIA.

- 179 OSTEOSPERMUM CÆRULEUM, foliis pinnatis; foliolis ferratis. *Jacq. coll. vol. 1.* Osteospermum pinnatifidum. *Herit. stirp.*
Caulis florentis pars superior.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

- 180 ORCHIS MASCULA, bulbis indivisis; nectarii labio quadrilobo, crenulato; cornu obtuso; petalis exterioribus acuminatis, patentissimis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Flor. dan. Hall. hist. helv. num. 1283.* Orchis morio mas, foliis maculatis. *Bauh. pin. Vaill. bot. Seg. ver.*
Tota planta florens. Flos seorsim. Petalum interius.



- 181 ORCHIS PALUSTRIS, bulbis indivisis; nectarii labio inverse triangulari, apicē obiter trilobo; lobis rotundatis, mediō emarginatō; cornu obtuso; petalis obtusis, exterioribus patulis. *Jacq. coll. vol. 1. Orchis mascula. Crantz. ausr.*
Tota planta. Nectarii labium inferius expansum.
- 182 ORCHIS MORAVICA, bulbis indivisis; nectarii labio trifido; lacinia media subrotunda, emarginata, amplissima; petalis conniventibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. *Boccus.*
- 183 ORCHIS RUBRA, bulbis indivisis; nectarii labio indiviso, crenulato, ampliato; cornu subulato; petalis erectis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Tota planta florens. *Boccus.*
- 184 OPHRYS MYODES, bulbis subrotundis; scapo folioso; nectarii labio oblongo, quadrifido; laciniis duabus mediis elongatis, lanceolatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Scop. carn. Hall. hist. helv. num. 1265.*
Tota planta florens.
- 185 OPHRYS CRUCIGERA, bulbis subrotundis; scapo folioso; nectarii labio indiviso, convexo, cruce insignito. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Planta florens. *Boccus.*

PENTANDRIA.

- 186 PASSIFLORA RUBRA, foliis bilobis, basi cordatis, villosulis, eglandulosis; fructibus obsolete hexagonis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Brown. hist. jam, num. 12. Clematis indica fructu hexagono etc. Plum. ic. Flos passionis media lacinia quasi abscissa, etc. Sloan. hist. jam.*
Ramulus florens. Duo fructus diversi. Semen. Idemque auctum.
- 187 PASSIFLORA INCARNATA, foliis trilobis, ferratis; petiolis ad basin folii biglandulosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Clematis trifolia. Bauh. pin. Granadilla Hispanis. Hern. mexic.*
Ramulus cum flore et fructu.

HEXANDRIA.

- 188 ARISTOLOCHIA BILOBATA, foliis bilobis; caule volubili. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Aristolochia foliis ferri equini etc. Plum. ic.*
Ramus florens.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

- 189 AXYRIS CERATOIDES, foliis lanceolatis, tomentosis; floribus fœmineis lanatis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Ceratoides orientalis, etc. Tourn. cor. Urtica foliis lanceolatis, etc. Royen. prodr.*
Ramus florens. Ramulus fructescens. Flos fœmineus auctus. Capsula. Semen auctum.
- 190 TRAGIA INVOLUCRATA, bracteis fœmineis pentaphyllis, pinnatifidis. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Ricinocarpus zeylanica etc. Burm. thes. Urtica fructescens malabarica. Raj. hist. Schorigenam. Rhed. mal.*
Caulis cum ramo florente. Semen. Germen, Bractea fœminea et Flos masculinus aucta.



POLYANDRIA.

- 191 JUGLANS NIGRA, foliis pinnatis; foliolis subuts villosulis, basi altera paulo breviorē; drupa glabra, punctata; nuce obtusa. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2. Gron. virg. Herm. lugd. Catesb. car. Act. jucc. 1767.*
Ramus flores gerens masculos et fœmineos cum foliis junioribus. Foliolum adultum. Fructus integer maturus. Nux. Eademque ad futuras dissecta.
- 192 JUGLANS CINEREA, foliis pinnatis; foliolis utrinque villosulis, basi subæqualibus; gemmis superaxillaribus; drupa villosa; nuce acuminata. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramulus cum floribus masculis et fœmineis, foliisque noviter egressis. Foliolum adultum. Ramulus cum fructibus foliisque abscissis. Ramulus junior cum gemmis superaxillaribus. Nux. Eadem dissecta per futuras.

MONADELPHIA.

- 193 PINUS MUGHUS. *Scop. carn.*
Ramus fructescens. Ramulus cum gemmis. Alius cum floribus.
Arbor hæc crescit in Austriæ montanis subalpinis atque etiam minus altis in sylvis. Est omnino ille Pinafter, quem Clusius, *hist. pag. 31.* vocat *schwarze Ferent*, et quem ceu meram varietatem Pinastris quarti ejusdem, veræ Pini Mughii Scopolianæ, habebam. Fateor, me in Pinos Austriacas nedum sat diligenter inquisivisse; quod prima occasione corrigam. Generis hujus species merentur attentius examinari a Botanicis, et nullus dubito, quin plurimas possideat Europa distinctissimas, quæ nunc confusæ ignoratæque latent.
- 194 CROTON GLANDULOSUM, foliis oblongis, ferratis, biglandulosis, fructibus sessilibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Croton minus trichotomum, etc. Brown. jam.*
Tota planta, quæ sub dio in denso agmine aliarum plantarum crevit. Hortulanus enim aulicus Schœnbrunnensis, dum ex utraque India in hortum Cæsareum vivæ arbores cum terra adhærente transmittuntur, imprimis emortuis in itinere arboribus, terram illam ipsam nunquam abjicit, sed in pulvillo feminum adinstar ipsorum feminat, unde, uti hoc Croton, plantas sæpe rarissimas germinasse gavifus est. In olla autem libere crescens ramos omnes stricte horizontaliter protendit.
- 195 RICINUS INERMIS, foliis peltatis, subpalmatis, ferratis; petiolis glandulosis; fructibus inermibus; caule arboreo. *Linn. syst. Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens. Alius fructescens. Capsula. Semen. Trunci pars. A dorso pars dimidia folii majoris.
- 196 RICINUS LIVIDUS, foliis peltatis, subpalmatis, ferratis, coloratis; petiolis glandulosis; caule arboreo. *Jacq. miscell. vol. 2.*
Ramus florens. Capsula. Semen. Fructus integer. Petioli cum glandula aucti pars.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

- 197 TERMINALIA CATAPPA, foliis observe ovatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Catappa Rumph. amb. Adamarum. Rhed. mal.*
Ramulus florens. Germen auctum. Reliquæ floris partes auctæ. Nux integra. Eadem cum dempta valvula minore. Nucleus.
- 198 MIMOSA SPECIOSA, inermis; foliis bipinnatis, subquadrijugis; pinnis subnovemjugis; foliolis oblongis, glabris; glandula supra costæ basin. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*
Ramulus florens. Pinna ex majoribus foliis. Pistillum. Flos.



C R Y P T O G A M I A.
F I L I C E S.

199 **ASPENIUM ANGUSTIFOLIUM**, frondibus simplicibus, lanceolato-linearibus, pedunculatis. *Jacq. coll. vol. 1.*

Tota planta florens.

200 **TRICHOMANES CANARIENSE**, frondibus supradecompositis, tripartitis; pinnis subpinnatis; pinnulis sublanceolatis, emarginatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1.*

Radicis pars cum una fronde. Pinna florens aucta in dorso, eademque antice visa. Duo Flosculi aucti.





Costus arabicus.
Jacq. Coll. vol. 1.



Salvia serotina.

Jacq. Misc. vol. 3.



Salvia abyssinica
Jacq. Coll. vol. 1.



Salvia spinosa.
Jacq. Coll. vol. 1.



Piper medium.
Jacq. Coll. vol. 1.



Piper obtusifolium.
Jacq. Coll. vol. 1.



Schœnus umbellatus.

Jacq. Coll. vol. 1.



Paspalum virgatum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Panicum maximum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Phleum asperum.
Jacq. Coll. vol. 1.



Phleum schoenoides.
Jacq. Coll. vol. 1.



Agrostis tenacissima.
Jacq. Misc. vol. 3.



Poa peruviana.
Jacq. Misc. vol. 3.



Poa disticha.
jacq. Misc. vol. 2.



Cynosurus sphaerocephalus.
jacq. Misc. vol. 2.



Cynosurus caruleus.
jacq. Misc. vol. 2.



Avena sterilis.
Jacq. Coll. vol. 1.



Rubia fruticosa.
Jacq. Misc. vol. 3.



Plantago maxima.
Tacq. Misc. vol. 3.



Diodia virginica.
Jacq. Misc. vol. 3.

520



Tournefortia cymosa
Jacq. Misc. vol. 3.



Cortusa Matthioli.
Jacq. Coll. vol. 1.



Lisianthus glaucifolius
Jacq. Misc. vol. 3!



Convolvulus floridus.
Jacq. Misc. vol. 3.



Ipomoea luteola
Jacq. Coll. vol. 2.



Ipomoea hederacea.
Jacq. Coll. vol. 1.



Physalis prostrata.
Jacq. Misc. vol. 3.



Solanum corymbesum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Solanum aculeatissimum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Solanum lycioides.
Jacq. Misc. vol. 3.



Cyrilla racemiflora
Jacq. Coll. vol. 1.



Vitis vinifera.
Jacq. Misc. vol. 3.



Nerium coronarium.
Jacq. Coll. vol. 1.



Echites domingensis.
Jacq. Misc. vol. 3.



Bupleurum petraeum.
Jacq. Coll. vol. 1.



Athamanta Matthioli.
Jacq. Coll. vol. 1.



Laserpitium Archangelica.
Jacq. Coll. vol. 1.



Albuca altissima
Jacq. Coll. vol. 2.



Scilla hyacinthoides.
Jacq. Misc. vol. 3.



Rumex glaucus.
Jacq. Misc. vol. 3.



Cassia fennoides
Jacq. Misc. vol. 3.



Cassia nuscifolia.
Jacq. Misc. vol. 5.



Cassia chinensis
Jacq. Misc. vol. 3.



Cassia Crista
Jacq. Misc. vol. 3.



Schotia speciosa.
Jacq. Coll. vol. 1.



Ruta legitima.
Jacq. Misc. vol. 3.



Dais laurifolia.
Jacq. Coll. vol. 1.



Andromeda lucida.
Jacq. Misc. vol. 3.



Saxifraga petraea.
Jacq. Coll. vol. 1.



Dianthus sylvestris.
Jacq. Coll. vol. 1.



Arenaria biflora
Jacq. Coll. vol. 1.



Lychnis grandiflora.
Jacq. Coll. vol. 1.



Euphorbia Clava
Jacq. Misc. vol. 3.



Euphorbia linifolia
Jacq. Coll. vol. 1.



Prunus Chamaecerasus.
Jacq. Coll. vol. 1.



Geum aleppicum
Jacq. Misc. vol. 3.



Cistus cretensis
Jacq. Misc. vol. 3.



Delphinium urceolatum.
Jacq. Coll. vol. 1.



Clematis angustifolia.

Jacq. Coll. vol. 1.



Phlomis caribaea
Jacq. Coll. vol. 1.



Phlomis zeylanica.
Jacq. Misc. vol. 5.



Dracocephalum austriacum.
Jacq. Coll. vol. 1.



Hyptis verticillata.
Jacq. Misc. vol. 3.



Hyptis capitata.

Jacq. Misc. vol. 3.



Arabis ovirensis.
Jacq. Coll. vol. 1.



Geranium glutinosum.
Jaeg. Misc. vol. 3.



Geranium tetragonum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Geranium revolutum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Geranium macrorrhizum.
Jacq. Coll. vol. 1.



Althaea narbonensis.

· Jacq. Misc. vol. 3.



Malva scoparia.
Jacq. Misc. vol. 3.



Hibiscus praemorsus.
Jacq. Misc. vol. 3.



Hibiscus virginicus.
Jacq. Coll. vol. 1.



Hibiscus pentacarpos
Jacq. Coll. vol. 1.



Dolichos Soja.
Jacq. Misc. vol. 3.



Glycine caribaea.
Jacq. Misc. vol. 3.



Robinia vesicaria.

Jacq. Misc. vol. 3.



Galega ochroleuca.
Jacq. Misc. vol. 3.



Astragalus hians.
Jacq. Misc. vol. 3.



Medicago carstiensis.
Jacq. Misc. vol. 3.



Tragopogon porrifolius.
Jacq. Misc. vol. 3.



Sonchus fruticosus
Jacq. Misc. vol. 3.



Hieracium saxatile.
Jacq. Misc. vol. 3.



Crepis albida.
Jacq. Misc. vol. 3.



Cacalia laciniata
Jacq. Misc. vol. 3.



Eupatorium scandens.
Jacq. Misc. vol. 3.



Artemisia hispanica.
Jacq. Misc. vol. 3.



Xeranthemum fulgidum.
Linn. suppl. pag. 365.



Tegea aleppica.
Jacq. Misc. vol. 3.



Centaurea Verutum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Osteospermum caruleum.
Jacq. Misc. vol. 5.



Orchis mascula.
Jacq. Misc. vol. 3.



Orchis palustris.
Jacq. Misc. vol. 5.



Passiflora rubra.
Jacq. Coll. vol. 1.



Passiflora incarnata.
Jacq. Misc. vol. 3.



Pinus Mughus.
Scop. carn. 2. pag. 247.



Croton glandulosum.
Jacq. Misc. vol. 3.



Terminalia Catappa.
Jacq. Coll. vol. 1.



Asplenium angustifolium.
Jacq. Coll. vol. 1.



Trichomanes canariense.
Jacq. Coll. vol. 1.

