

# **PRESEK**

**List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje**

ISSN 0351-6652

Letnik **16** (1988/1989)

Številka 4

Strani 194-196

Dragoljub M. Milošević, priredba in prevod Boris Lavrič:

## **SREDINI NA TEHTNICI**

Ključne besede: matematika, naloge.

Elektronska verzija:

<http://www.presek.si/16/940-Milosevic-Lavric.pdf>

© 1989 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

© 2010 DMFA - založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

## SREDINI NA TEHTNICI

Znamenita neenakost med aritmetično in geometrično sredino pozitivnih števil je doživela vrsto različnih dokazov. V dvajsetih letih 18. stoletja jo je dognal škotski matematik *C. Maclaurin*, slabih sto let kasneje pa *A.L. Cauchy*, po katerem je ponekod celo dobila ime. Tu bomo predstavili izredno kratek (a manj poznan) dokaz te neenakosti in nekaj zanimivih posledic.

Najprej opredelimo obe omenjeni sredini.

Naj bodo  $a_1, a_2, \dots, a_n$  nenegativna realna števila. Potem je

$$A = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

njihova aritmetična sredina in

$$G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

njihova geometrična sredina.

Če sta števili le dve ( $a_1$  in  $a_2$ ), je njuna aritmetična sredina  $A = (a_1 + a_2)/2$  vsaj tolikšna kot njuna geometrična sredina  $G = \sqrt{a_1 a_2}$  (torej  $A \geq G$ ), kar je znal utemeljiti že Evklid. Poskusite še vil

Tudi za  $n > 2$  velja

$$A = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = G \quad (AG)$$

To je neenakost, o kateri smo govorili na začetku prispevka in jo bomo zdaj dokazali.

Zaradi simetrije v (AG) lahko brez škode predpostavimo, da velja

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$$

Potem je  $na_1 \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq na_n$ , torej  $a_1 \leq A \leq a_n$ . Zato velja  $(A - a_1)(a_n - A) \geq 0$ , od koder dobimo

$$(a_1 + a_n - A) A \geq a_1 a_n \quad (1)$$

Naprej bo dokaz potekal z matematično indukcijo. Pri  $n = 1$  (AG) očitno velja. Predpostavimo, da neenakost (AG) drži za  $n - 1$  in jo uporabimo za števila

$$a_2, a_3, \dots, a_{n-1} \quad \text{in} \quad a_1 + a_n - A$$

Tako dobimo oceno

$$A = \frac{a_2 + \dots + a_{n-1} + (a_1 + a_n - A)}{n-1} \geq \frac{n-1}{\sqrt[n-1]{a_2 \dots a_{n-1} (a_1 + a_n - A)}}$$

odkoder s pomočjo (1) pridemo do iskane neenakosti

$$A^n = A^{n-1} \cdot A \geq a_2 \dots a_{n-1} (a_1 + a_n - A) A \geq a_1 \cdot a_2 \dots a_n$$

Dokaz je s tem končan, bralca pa vabimo, da s ponovnim sprehodom skozenj dožene, da v (AG) velja enačaj natanko takrat, kadar je  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

Poglejmo še nekaj primerov uporabe neenakosti (AG).

1. Dokažimo, da ima med vsemi kvadri z dano prostornino kocka najmanjšo površino. Označimo robove kvadra z  $a$ ,  $b$  in  $c$ . Kocka z enako prostornino ima rob  $k = \sqrt[3]{abc}$  in površino  $6k^2$ . Za površino kvadra nam (AG) da zeleno oceno

$$2(ab + bc + ca) \geq 6 \sqrt[3]{(ab)(bc)(ca)} = 6k^2$$

2. Vzemimo poljubno nenegativno realno število  $x$ . Postavimo  $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 1$  in  $a_n = 1 + nx$  v neenakost (AG) pa dobimo oceno

$$1 + x = \frac{1}{n} \underbrace{(1 + \dots + 1 + (1 + nx))}_{n-1} \geq \sqrt[n]{1 + nx}$$

ki jo preoblikujemo v znano Bernoullijevo neenakost

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

3. Označimo z  $v_a$ ,  $v_b$  in  $v_c$  višine trikotnika  $ABC$ , z  $r$  pa polmer vanj včrtanega kroga. Dokazali bomo, da velja neenakost

$$3r \leq \sqrt[3]{v_a v_b v_c}$$


Označimo s  $p$  ploščino trikotnika  $ABC$ , pogledjmo na sliko in zabeležimo:

$$av_a = bv_b = cv_c = 2p = ar + br + cr$$

Od tod z uporabo (AG) dobimo oceno

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{a+b+c}{2p} = \frac{1}{v_a} + \frac{1}{v_b} + \frac{1}{v_c} \geq \\ &\geq \frac{3}{\sqrt[3]{v_a v_b v_c}} \end{aligned}$$

odkoder sledi iskana neenakost.



Za konec pa še nekaj nalog.

1. Dokaži naslednje neenakosti:

$$1 + \frac{x}{3} > \sqrt[3]{1+x}; \quad x > 0$$

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \geq \frac{3}{2}; \quad x, y, z > 0$$

$$n^n \geq 2^{n-1} n!; \quad n \in \mathbb{N}, n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

2. Med vsemi kvadri z enako površino ima kocka največjo prostornino. Dokaži.
3. Dokaži, da za  $a > 1$  velja neenakost

$$\log_a(a+1) < \log_{a-1}a$$

4. V dano kroglo včrtaj stožec z največjo prostornino.
5. Dokaži, da je težiščnica ostrega kota v pravokotnem trikotniku vsaj tolikšna kot geometrijska sredina obeh katet.

*Dragoljub M. Milošević*  
prir. in prev. *Boris Lavrič*