

IZ ORNITOLOŠKE BELEŽNICE

From the ornithological notebook

SLOVENIJA / SLOVENIA

PRITLIKAVI KORMORAN *Phalacrocorax pygmeus*
Pygmy Cormorant – several observations of a single immature individual between 25 Jul and 29 Aug 2004 at Medvedce reservoir SE of Pragersko (UTM WM53, NE Slovenia); on 2 Aug 2004, 5 individuals (2 adult, 3 immature) were observed

Med obiskom vodnega zadrževalnika Medvedce jugovzhodno od Pragerskega (SV Slovenija) dne 25.7.2004 sem med številnimi kormorani *Phalacrocorax carbo* opazil osamljen mladostni osebek pritikavega kormorana. Verjetno isti osebek se je zadrževal na zadrževalniku do 29.8.2004. Dne 2.8.2004 sem naletel na kar pet osebkov te pri nas redke vrste, od katerih sta bila dva odrasla, trije pa mladostni. Večina podatkov o pojavljanju pritikavih kormoranov v Sloveniji je iz zimskega obdobja [ŠTUMBERGER, B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 21 (102/103): 261–274; BOŽIČ, L. (2001): Poročilo nacionalne komisije za redkosti o opazovanih redkih vrst ptic za obdobje 1997 – 2000. – *Acrocephalus* 22 (106/107): 109–113; ŠALAMUN, Ž. (2001): Pritlikavi kormoran *Phalacrocorax pygmeus*. – *Acrocephalus* 22 (108): 175; BORDJAN, D. (2002): Pritlikavi kormoran *Phalacrocorax pygmeus*. – *Acrocephalus* 23 (110/111): 49; KOČEVAR, J. (2002): Pritlikavi kormoran *Phalacrocorax pygmeus*. – *Acrocephalus* 22 (109): 233]. Pri vseh teh primerih gre za posamezna opazovanja in ne za zadrževanje, v opisanem primeru pa se je osebek zadrževal več kot mesec dni.

Dejan Bordjan, Ulica 8. februarja 50, SI-2204 Miklavž, Slovenija, e-mail: dejanonih@email.si

ČRNA ŠTORKLJA *Ciconia nigra*

Black Stork – regularly occurring along the Sava river near Kresnice (260 m a.s.l., UTM VM80, central Slovenia) in the summer months from 2002 to 2004, and observation of 1 individual near Črni vrh in Tuhinjska valley (600 m a.s.l., UTM VM81, central Slovenia) on 11 Jul 2004

V Kresnicah na južnem bregu Save (260 m n.v.), približno 200 m V od mostu čez Savo, se je od leta

2002 do 2004 v poletnih mesecih redno pojavljala črna štoklja. Navadno je stala na grušču tik ob vodi, kjer se je verjetno prehranjevala. Čeprav je ob Savi več gozdičkov, kjer bi utegnila gnezditi, gnezda nisem nikoli našel. Očitno je Sava na tem predelu pomembno prehranjevališče črne štoklje, saj je bila vrsta tu opazovana že leta 1983 [MATVEJEV, S.D. (1984): Črna štoklja *Ciconia nigra*. – *Acrocephalus* 5 (19/20): 22]. Sicer pa sem črno štokljo v bližini opazoval tudi 11.7.2004 v Tuhinjski dolini pri Črnem vrhu (600 m n.v.).

Andrej Kapla, Cesta Hermana Debelaka 21, SI-1430 Hrastnik, Slovenija, e-mail: trechus@volja.net

ČRNA ŠTORKLJA *Ciconia nigra*

Black Stork – 2 adults and 1 juvenile observed on 7 Aug 2004 in a wet meadow at Strug between Makole and Majšperk (UTM WM53, Dravinja valley, NE Slovenia)

Dne 7.8.2004 sva okrog 18.30 ob Dravinji v Strugu med Makolami in Majšperkom (UTM WM53, Dravinjska dolina) opazovala 2 odrasli črni štoklji in mladiča, ki so se prehranjevali v družbi 7 grivarjev *Columba palumbus* in 4 duplarjev *C. oenas* na pokošenem vlažnem travniku. Črne štoklje se pogosto pojavljajo ob bližnjem vodnem zbiralniku Medvedce [VOGRIN, M. (1990): Črna štoklja *Ciconia nigra*. – *Acrocephalus* 11 (43/44): 29], sicer pa črna štoklja gnezdi na Pohorju [BOŽIČ, L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice 2. – Monografija DOPPS št. 2, DOPPS, Ljubljana] in v Hočah pri Mariboru [BRAČKO, F. (1996): Črna štoklja *Ciconia nigra*. – *Acrocephalus* 17 (74): 29]. Morda pa opazovana družina izvira iz kakega doslej še nepoznanega gnezdišča v velikem gozdnem kompleksu bližnjega Bočkega pogorja in Donačke gore.

Petra Vrh, Grič C. IX/1, SI-1310 Ribnica, Slovenija, e-mail: petravrh@yahoo.com
 Al Vrežec, Pražakova 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: al.vrezec@nib.si