

Osebna izkaznica: TEMNI SLANIŠČAR (*Selysiothemis nigra*)

Predstavlja: Damjan Vinko

Foto: Cristoph Brochard (Sl. 3–7; Grčija, Italija), Brina Stančič (Sl. 8), Toni Koren (Sl. 1; Hrvaška) in Ali Šalamun (Sl. 2; Hrvaška)

Temni slaniščar (*Selysiothemis nigra*) je kačji pastir iz družine ploščcev (Libellulidae). Od preostalih vrst ga zlahka ločimo; baza kril je brez madeža, pterostigma in tanjše žilje kril sta blede siva. Posteriorna in anteriorna žila pterostigme sta debelejši in črni, spominjata na enačaj »=«. Njegova krila že v rahli sapici spominjajo na plapolanje zastave. Samci (sl. 1) so temni, skoraj črni (sl. 2), često še z rahlo modrikastim poprhom. Samice (sl. 3) in mladi samci (sl. 4) so večinoma peščenih barv, s temno rjavimi programi na oprsju in temnim vzorcem na zadku. Največkrat počiva na osamelih vejicah ali rastlinah blizu vodnega bivališča, pogosto z rahlo dvignjenim zadkom (sl. 5).



Ličinke (sl. 6), ki razmeroma hitro odrastejo, prebivajo na vodnem rastlinju in lahko prenesejo tudi visoko koncentracijo soli. Je migratorna in nomadska vrsta. Srečamo jo ob plitvih mlakah in jezerih ter zadrževalnikih, tudi ob brakičnih vodah in na kraških poljih. Leve temnega slaniščarja prepoznamo po značilnih dobro razvitih hrbtnih in stranskih trnih (sl. 7).



Tega malega raznokrilega kačjega pastirja, ki meri le okoli 3 cm, smo pri nas zabeležili le trikrat. Dvakrat je bil leta 2012 opažen v Škocjanskem zatoku, v 2019 pa smo odrasle osebkje in odlaganje jajc opazovali pri Serminu (sl. 8). V Tržaškem zalivu je nedavno »naturaliziran« in očitno širi svoje območje razširjenosti, kar povezujejo s podnebnimi spremembami. Razpršeno je razširjen po celotnem Sredozemlju, v severni Afriki ter na vzhodu vse do Arabskega polotoka in jugozahodne Azije. ☼