

Fitogeografska in taksonomska problematika vrste***Leontodon tenuiflorus* (Gaud.) Rchb.****A contribution to the phytogeography and taxonomy
of *Leontodon tenuiflorus* (Gaud.) Rchb.**

BOŠKO ČUŠIN

Biološki inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, Slovenija; cusin@zrc-sazu.si

Najdba tankokoškastega jajčarja na hudourniškem produ v povirju Nadiže je fitogeografsko zanimiva, saj lokaliteta sodi na skrajni vzhodni rob njegovega areala, ki se ujema tudi z vzhodno mejo vrst *Spiraea decumbens* in *Euphorbia triflora* subsp. *kernerii*. Vrsta uspeva v fragmentu fitocenoze, ki jo lahko uvrstimo v red *Epilobietalia fleischeri*. Na rastišču, poleg sive vrbe, prevladujejo vrste iz razreda *Thlaspietea*.

Nabrane rastline se že po videzu dobro ločijo od podobnih taksonov, zlasti so značilni ozki in temnozeleni listi, raskavi na otip. Dolgopecljati laski s kratkimi kraki pa so le potrdili našo ugotovitev. Zato se pridružujemo avtorjem, ki obravnavani takson vrednotijo kot vrsto.