

Kako se s čebelami prebiti čez muhasto pomlad

Vlado Auguštin in Simon Golob

svetovalca JSSČ za tehnologijo čebelarjenja


vlado.augustin@czs.si in simon.golob@czs.si

Po izredno mili zimi in uspešni prezimitvi čebel smo zadnji teden marca poleg vseh neprijetnosti, ki se trenutno dogajajo pri nas in po svetu, dobili še pošiljko hladnega vremena. Narava je pred tem že dodobra oživela, temu pa so sledile tudi čebelje družine, ki so se pospešeno razvijale in že končevale z menjavo generacij. Panji so se začeli polniti, zaloge hrane pa pospešeno kopteti. V pričakovanju lepega vremena bi čebele že lahko prinesle prve pozitivne donose v panje, pa je vreme vse skupaj ustavilo.

Povsod po državi je akacija začela z brstenjem. Na najtoplejših legah je že odgnala, drugod, kjer malo kasni, pa so brsti prav tako počili in začeli odganjati. Iz izkušenj vemo, da je akacija izrazito toploljubna rastlina, in v takem stadiju razvoja temperature okoli nič ali pod ničlo vsekakor škodijo. Zato lahko skoraj zagotovo trdimo, da letos težko pričakujemo dobro akacijevu pašo. Tudi druge rastline niso imune na pozebo, zato je pozeba prizadela tudi medenje češenj in sadnega drevja, vseeno pa si lahko obetamo nekaj paše na regratu, ki je na pozebo razmeroma neobčutljiv in bo cvetel in medil, ko se bo vreme stabiliziralo. Oljna ogrščica bo zaradi pozebe in ohladitve nekoliko zakasnila s cvetenjem, sama pozeba pa ji prav tako ni in ne bo škodila.

Glede na letošnje vremenske razmere, ki so z visokimi zimskimi temperaturami omogočile hiter razvoj čebeljih družin, ter omenjeno pozebo, ki je na nekaterih območjih »odnesla« prve intenzivnejše paše, moramo biti čebelarji še posebej pozorni na količino hrane v čebelji družini. Uspešno prezimljena čebelja družina mora imeti v tem obdobju v panju tri do štiri sate pokritega medu, to je 7 kg medu s cvetnim prahom, ki je bodisi na stranskih satih bodisi v venci okrog zalege. Če v panju ni dovolj hrane, čebelja družina strada in številčno slabi, zato pravzaprav nimamo druge izbire, kot da čebelam hrano dodamo. Če imamo rezervne medene sate, jim te ponudimo in pri tem nastrgamo pokrovce, da čebele hitreje primejo in se ne trudijo z odkrivanjem medu. Če takih satov nimamo in ni prehladno, jih lahko nakrmimo tudi s sladkorno raztopino v razmerju 3 : 2.

Naše delo pri čebeljih družinah v prihodnjih tednih bo seveda, kot vsako leto, močno odvisno od vremena in zunanjih pogojev. V vsakem primeru pa lahko pričakujemo, da



S slano pokrite cvetoče divje češnje dne 22. marca 2020 v Šmartnem ob Paki

Foto: Franc Šimerc

bomo lahko že v kratkem zaradi razvoja čebeljih družin tem že širili gnezda in s tem maticam omogočali nemoteno zaleganje. Sprva ob gnezdo dodajamo že izdelane sate, kasneje pa že tudi prve satnice in ob rob gnezda tudi gradilni sat. Da nam kasneje v sezoni ne bo zmanjkovalo satnic, panjev in druge opreme, lahko sedanji čas, ko se zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa zadržujemo bolj ali manj doma, še koristno izkoristimo in si potrebno opremo in material tudi pripravimo. Obenem pa lahko ta čas izkoristimo tudi za izobraževanje. Pogledamo si zbornik predavanj ApiSlovenije, ki vključuje tudi nov priročnik Dobre čebelarke prakse, na naši spletni strani pa predelamo tudi vsebine, ki jih ponuja Virtualni svetovalec, ter druge vsebine, ki so dostopne na spletni strani ČZS.

Zahvala

Zahvaljujem se Čebelarški družini Trebnje in njenim članom za denarno pomoč pri sanaciji pogorelega objekta. Iskrena hvala.

Ivan Podpadec