

Mnogokotniška števila

↓↓↓

BOŠTJAN KUZMAN


→ **Mnogokotniška števila dobimo z razporejanjem enakih krožcev v obliko pravih mnogokotnikov. Lastnosti takih števil so starodavne civilizacije občudovale še pred odkritjem pisave in zahtevnejših matematičnih postopkov, mi pa si bomo ogledali, kako jih narisati s pomočjo programa GeoGebra.**

Trikotniška števila

Najpreprostejša mnogokotniška števila so trikotniška. Za n -to trikotniško število $T(n) = \frac{n(n+1)}{2}$ potrebujemo trikotnik z n stolpci (ali vrsticami), v katerem ima vsak naslednji stolpec en krožec več kot prejšnji. Z uporabo dvojnih zaporedij lahko trikotniška števila v GeoGebri narišemo z le enovrstičnim ukazom. Namesto krožcev bomo risali kar točke in jih nato nekoliko odebelili z orodji za obliko. Najprej ustvarimo drsnik z imenom n , ki naj bo celo število med 1 in 10. Nato ustvarimo zaporedje $j = 1, \dots, n$ stolpcov, v katerem j -ti stolpec predstavlja zaporedje $k = 1, \dots, j$ točk tako, da uporabimo ukaz `Zaporedje(Zaporedje((j,k),k,1,j),j,1,n)` (glej sliko 1).


Da bodo točke zares predstavljale pravilni oziroma enakostranični trikotnik, pa jih moramo še nekoliko zamakniti. Predstavljajmo si, da točke v j -tem stolpcu ležijo na premici skozi točko $(j, 1)$ z enotskim smernim vektorjem $(-1/2, \sqrt{3}/2)$, kar ustreza desni stranici enakostraničnega trikotnika z vodoravno osnovnico. Ustrezno razporeditev dobimo z ukazom `Zaporedje(Zaporedje((j,1)+(k-1)*(-1/2,sqrt(3)/2),k,1,j),j,1,n)` (glej sliko 2).

S premikanjem drsnika lahko zdaj prikažemo različna trikotniška števila, dodatno pa lahko z orodjem za besedilo na zaslon izpišemo tudi ustrezno vrednost $T(n)$.



SLIKA 1.

`Zaporedje(Zaporedje((j,k),k,1,j),j,1,n)`




SLIKA 2.

`Zaporedje(Zaporedje((j,1)+(k-1)*(-1/2,sqrt(3)/2),k,1,j),j,1,n)`



Splošna k -kotniška števila

Splošna mnogokotniška števila dobimo z dodajanjem krožcev v pravilni k -kotnik, tako da v n -tem koraku na vsaki stranici leži en krožec več kot prej. Z nekaj truda bi lahko izpeljali znano formulo za izračun n -tega k -kotniškega števila $P_k(n) = \frac{n}{2}((k-2)(n-1) + 2)$, a se bomo raje posvetili potrebnim korakom za izdelavo prikaza mnogokotniških števil z dvema drsnikoma v GeoGebri.



SLIKA 3.

Možnih je seveda več načinov, sam pa predlagam uporabo polarnih koordinat: ukaz $(r;a)$ v GeoGebri nariše točko, ki je za razdaljo r oddaljena od koordinatnega izhodišča, premica skozi to točko in izhodišče pa z osjo x oklepa kot a . Oglišča pravilnega petkotnika s središčem v točki $(0,0)$ lahko zato narišemo z ukazom $\text{Zaporedje}((1;2*\pi*j/5),j,0,4)$, ki razdeli kot 2π na pet enakih delov in označi ustrezne točke na enotski krožnici.

Mnogokotniška števila zdaj narišemo z naslednjimi koraki:

- Izdelamo drsnika za k in n ter označimo točko $(0,0)$.
- Izdelamo zaporedje n naraščajočih k -kotnikov s skupnim krajiščem v točki $(0,0)$. Oglišča posameznega k -kotnika pri tem narišemo z uporabo polarnih koordinat in delitvijo kroga na k delov,

denimo $\text{Zaporedje}((1;2*\pi*j/k),j,0,k-1)$. Z uporabo dvojnega zaporedja pa narišemo zaporedje k -kotnikov tako, da v vsakem koraku nekoliko povečamo radij in premaknemo središče. V moji rešitvi raste radij od 1 do n , središče pa se pomika v desno od $(1,0)$ do $(n,0)$. S tem smo dobili točke, ki so na sliki zelene:

$\text{Zaporedje}(\text{Zaporedje}((i,0)+(i;2*\pi*j/k+\pi),j,0,k-1),i,1,n-1)$

- Če želimo narisati tudi stranice mnogokotnikov, lahko posebej dodamo še ustrezno zaporedje daljic, ki povezujejo dve zaporedni točki od prej:

$\text{Zaporedje}(\text{Zaporedje}(\text{Daljica}((i,0)+(i;2*\pi*j/k+\pi),i,0)+(i;2*\pi*(j+1)/k+\pi)),j,0,k-1),i,1,n-1)$

Ukaz, s katerim so na sliki narisane zeleno črtkane nosilke oglišč, pa prepustimo bralcu.

- Narisali smo mnogokotnike, a dodati je potrebno še delitvene točke na notranjih stranicah j -tega k -kotnika. Delitvene točke neke daljice AB lahko določimo s pomočjo vektorske enačbe premice $A + s(B - A)$, kjer parameter s zavzame ustrezne vrednosti med 0 in 1. Ukaz $\text{Zaporedje}((0,0)+s*(1,1)/5,s,1,4)$ bi na primer razdelil daljico od $(0,0)$ do $(1,1)$ na pet enakih delov in vrnil štiri notranje delitvene točke. Če to idejo uporabimo za točke, ki predstavljajo krajišča notranjih daljic mnogokotnikov, bomo s tem dodali še manjkajoče točke, ki so na sliki oranžne:

$\text{Zaporedje}(\text{Zaporedje}(\text{Zaporedje}((i,0)+(i;\pi+2*\pi*j/k)+s*((i;\pi+2*\pi*(j+1)/k)-(i;\pi+2*\pi*j/k))/i,s,1,i-1),j,1,k-2),i,1,n-1)$

- V zadnjem koraku lahko vse skupaj še nekoliko grafično dodelamo in s pomočjo formule za $P_k(n)$ tudi izpišemo željeno vrednost na zaslon.

Tako izdelano ponazoritev mnogokotniških števil si lahko bralci ogledajo na spletnem naslovu www.geogebra.org/classic/ukkzq4ps.

× × ×

www.dmfa.si