

KRONIČNE AVTOIMUNE BULOZNE DERMATOZE V OTROŠKI DOBI

M. Starbek Zorko, V. Dragoš

Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

IZHODIŠČA

Kronične avtoimune bulozne dermatoze so redke bolezni otroške dobe, ki se klinično kažejo z vezikulobuloznimi spremembami kože in sluznic. Diagnostika temelji na izvidu histološkega in imuno fluorescenčnega pregleda tkiva ter na dokazovanju specifičnih protiteles. Pri otrocih se izmed buloznih dermatoz najpogosteje pojavljajo kronična bulozna dermatosa v otroštvu (linearna dermatosa IgA), dermatitis herpetiformis Dühring (DHD) ter bulozni pemfigoid.

METODE

Predstavili bomo najpogostejše kronične bulozne dermatoze v otroštvu, njihovo pestro klinično sliko, diagnostiko ter širino diferencialne diagnostike.

ZAKLJUČKI

Kronične avtoimune bulozne dermatoze so bolezni, ki jih v zgodnjem življenjskem obdobju srečujemo redko. Na otroškem oddelku Dermatovenerološke klinike v Ljubljani letno obravnavamo le posamezne primere otrok s kronično bulozno dermatozo. Zavedamo se, da lahko neznčilna, morda diskretna klinična slika ter občasno opisana dobra odzivnost kožnih sprememb na lokalna kortikosteroidna mazila katerega od mladih bolnikov niti ne privede do dermatologa, ki je zdravnik, prvenstveno usposobljen za prepoznavanje in zdravljenje tovrstne patologije.