

namenskimi pripomočki. Za pridelavo varne hrane je pomembno, da smo seznanjeni z vsemi zahtevami glede zakonodaje in uporabe zdravil za zatiranje varoj, zato je zelo priporočljiva udeležba na predavanjih s tovrstno tematiko. Rezultati raziskave obravnavajo le del vzorcev slovenskih čebeljih pridelkov, na podlagi katerega lahko sklepamo o stanju v Sloveniji, ki kaže, da moramo skrbni za varnost voska in propolisa posvetiti še več pozornosti. 🍯

Viri:

Lilek, N., Bedek, M., Glinšek, A. (2017): Poročilo o izvedbi Programa podpo-

re laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov – sklop 3. Analiza cvetnega prahu, propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj. Čebelarstva zveza Slovenije in ERICo d. o. o. Velenje.

Lilek, N., Bedek, M., Glinšek, A. (2018): Poročilo o izvedbi Programa podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov – sklop 3. Analiza cvetnega prahu, propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj. Čebelarstva zveza Slovenije in Eurofins ERICo, Inštitut za ekološke raziskave d. o. o. Velenje.

Lilek, N., Bedek, M., Orešnik, K. (2019): Poročilo o izvedbi Programa podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov – sklop 3. Analiza cvetnega prahu, propolisa in voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoj. Čebelarstva zveza Slovenije in Eurofins ERICo, Inštitut za ekološke raziskave d. o. o. Velenje.

Svetli in temni zemeljski čmrlj (*Bombus lucorum/terrestris*)

doc. dr. Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
danilo.bevk@nib.si

Svetli zemeljski čmrlj je najpogostejša vrsta čmrlja pri nas in za večino ljudi je to najbolj tipičen predstavnik čmrljev. Zelo podoben mu je manj pogost, a vseeno precej razširjen temni zemeljski čmrlj. Ker sta si tako podobna, ju predstavljamo skupaj. Oba sta v osnovi črna čmrlja z rumeno progno na začetku oprsja in na drugem obročku zadka. Rumeni progi na zadku sledi črna, konica pa je bela. Pri svetlem zemeljskem čmrlju je rumena barva čista, svetla, pri zemeljskem pa bolj temna in motna, vendar pa ju je samo po barvi težko zanesljivo ločiti. Osebkni so večinoma veliki.

Matice so dejavne med prvimi spomladi, v nižinah največkrat marca, lahko že prej. Gnezdiyo večinoma pod zemljo v opuščeni gnezdihi malih sesalcev. Družine so velike in štejejo nekaj sto osebkov. Vrsti sta pogosta in pomembna opraševalca sadnega drevja in jagodičja. Ker sta dejavni tudi že zgodaj zjutraj, so matice pomladi zelo izpostavljene morebitnim



Svetli zemeljski čmrlj na sončnici

Foto: Danilo Bevk

ostankom pesticidov na sadnem drevju. Če že, je zato bolj varno škropiti zelo pozno zvečer. Temnega zemeljskega čmrlja v Evropi množično gojijo za opraševanje v rastlinjakih. 🍯

	Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo		
	Prosimo vas, da, če še niste, poročila o porabi prelepka in količini medu, označenega s prelepki SMGO, v letu 2019 čim prej posredujete na e-naslov ines.zunic@czs.si.		
	Število novih članov SMGO-ja decembra 2019	Število članov, ki so izstopili decembra 2019	Število vseh članov SMGO-ja decembra 2019
	4	0	430
Za vključitev v kakovostno shemo »Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo« navežite stik z go. Natašo Lilek: po tel.: 040/436 519 ali 01/729 61 29 oz. na e-naslovu: natasa.lilek@czs.si. Več informacij najdete na spletni strani www.slovenskimed.si pod rubriko SMGO.			